



Lungmottagningen

Datum

Inför Metakolintest på ANS

Undersökningen är till för att testa känsligheten i luftvägarna och beräknas ta cirka 1,5 timmar.

Förberedelser

Du får inte:

- ha varit förkyld under de senaste 2 veckorna före undersökning.
- ha haft lunginflammation de senaste 4 veckorna före undersökning.
- röka 6 timmar före undersökning.
- utöva något tungt fysiskt arbete samma dag.
- dricka kaffe, te, energidryck eller Coca-Cola (koffeinhaltiga drycker) 4 timmar före undersökning.

Du ska inte ta följande mediciner före undersökning:

6 timmar: Airomir, Bricanyl, Buventol, Ventoline, Ventilastine, Salbutamol, Combivent, Ipramol, Salpira, Salpimol, Airsalb, Pulmicort, Giona, Beklametason, Flutide, Fluticasone, Asmanex, Alvesco, Aerobec, Budesonlid, Novopulmon.

12 timmar: Atrovent, Spiriva, Theo-Dur.

3 dygn: Oxis, Serevent, Symbicort, Seretide, Innovair, Flutiform, Relvar, Bufomix, Salfumix, Duoresp, Bevespi, Duaklir, Formatrix, Trimbrow, Aerivio Spiromax, Airflusal, SalmexAnoro, Trelegy med flera.

5 dygn: Aeries, Cetirizin, Clarityn, Kestine, Ebastin, Telfast, Zyrlex, Nefoxef-Loratadin, Tavegyl, Desloratadin, Dasselta, Allegra, Flynnise samt övriga antihistamintabletter. Nässpray och ögondroppar Livostin/Lomudal (enstaka doser av nässpray eller ögondroppar har ingen betydelse).

7 dygn: Singulair, Montelukast.

Prata med din läkare innan testet om du står på:

- behandling med kortison-tabletter eller har fått kortisonkur i tablettform de senaste 4-6 veckorna innan testet utförs.
- någon medicin som inte anges enligt ovan eller tror dig ha svårt att vara utan medicinerna den tid som anges.