



Barn unga och folkhälsa

Datum

Remisskriterier för barn och ungdomar med funktionella mag-tarmproblem till Angeredes närsjukhus

Remisser ställda till Angeredes Närsjukhus gällande barn och ungdomar med funktionella mag- tarmproblem behöver innehålla en tydlig frågeställning för att vi ska kunna ta emot patienten. Vi har inte en IBS mottagning. Det vi erbjuder är:

IBS/ Mag-tarmskola

Brev med önskemål om IBS-skola skickas till: Specialistcentrum Barn och Unga Angered. För att kunna remitteras till IBS-skola ska barnet uppfylla nedanstående kriterier för IBS, Funktionell Dyspepsi eller Funktionell Buksmärta, se diagnoskriterier nedan.

IBS-skolan hålls vid 2 tillfällen per termin och ges till barn/ungdomar med föräldrar från och med att barnet/ungdomen är 13 år. Skolan genomförs under en eftermiddag och därefter avslutas kontakten med mottagningen. Patienten remitteras alltså enbart för detta tillfälle och fortsätter sedan sin kontakt hos inremitterande, om inte annan plan finns.

Second opinion funktionell mag-tarmsjukdom

Remiss med önskemål om second opinion skickas till Specialistcentrum Barn och Unga Angered eller Gamlestaden. Dessa tas emot när man efter långvarig patientkontakt inte kommer vidare trots gedigen utredning samt att man provat erforderliga och relevanta behandlingar utan resultat.

För att kunna bedöma barnet behöver det till remiss bifogas en fullständig kopia på journalen inklusive tillväxtkurva och provsvar/svar på utredningar (till exempel röntgen, klin fys). Vi önskar också föräldramedgivande för att

beställa journalkopia från BHV och skolhälsovård om inte denna redan är bifogad remissen.

IBS-kriterier

Buksmärta minst 4 dagar per månad associerat med EN eller FLERA av följande

- Relaterat till defekation
- Förändrad avföringsfrekvens
- Förändrad avföringsform

Buksmärtan har inte försvunnit trots välbehandlad förstoppning (om buksmärtan försvinner på behandling för förstoppning så har barnet funktionell förstoppning, inte IBS).

Efter noggrann bedömning så kan symtomen inte förklaras av annan medicinsk/psykiatrisk orsak (till exempel celiaki, ångestsyndrom, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning).

Funktionell dyspepsi - kriterier

Ett eller flera av följande symtom minst fyra gånger per månad. Symtomen ska ha funnits i minst 2 månader innan diagnosen är satt och vara av sådan grad att de påtagligt påverkar normal daglig aktivitet

- Uppblåsthet i magen efter måltid
- Snabb mättnadskänsla
- Smärta eller brännande känsla i epigastriet som inte uppkommer i anslutning till defekation
- Efter noggrann bedömning kan symtomen inte helt förklaras av annan medicinsk/psykiatrisk orsak (till exempel celiaki, ångestsyndrom, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)

Funktionell buksmärta - kriterier

Samtliga dessa kriterier måste vara uppfyllda minst 4 gånger per månad

- Intermittent eller kontinuerlig buksmärta som inte uppträder enbart i anslutning till fysiologiska processer i kroppen (till exempel menstruation, i anslutning till måltid)
- Otillräckliga kriterier för IBS, funktionell dyspepsi
- Efter noggrann bedömning kan symtomen inte helt förklaras av annan medicinsk/psykiatrisk orsak (till exempel celiaki, ångestsyndrom, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)

- Kriterierna ska vara uppfyllda i minst 2 månader innan diagnosen är satt