


Hemorroider – operation



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN
KUNGÄLVIS SJUKHUS

Symtom och diagnos

Hemorroider är vanligt. Minst hälften av alla personer, män som kvinnor, får hemorroider någon gång i livet.

I analkanalens nedre del under slemhinnan finns "kuddar" som består av bindväv, muskulatur och blodkärl. Dessa kuddar är viktiga för att kunna kontrollera läckage av luft och avföring. Ålder, förstoppning, kraftig krystning, diarré, graviditet/förlossning och övervikt m.m. kan leda till att blodkärlen i kuddarna vidgas (hemorroider). Detta gör att kuddarna förstoras vilket kan orsaka hemorroidbesvär i form av blödningar, klåda eller läckage av slem/avföring.

Hemorroidbesvär kan gå tillbaka av sig själv utan någon behandling. Om hemorroiderna är stora eller orsakar kraftiga blödningar kan man behöva operera bort dem.

Operationen

Inför operationen ska ändtarmen vara rengjord med lavemang. Klyx à 120 ml finns att köpa på apoteket, du behöver två stycken. Ta ett lavemang kvällen före och ett lavemang på operationsdagens morgon.

Operationen innebär att man avlägsnar hemorroiderna i ändtarmsöppningen. Såret sys antingen igen eller lämnas öppet och får läka av sig själv.

I de flesta fall kan du gå hem samma dag som operationen har utförts.

Efter operationen

Efter toalettbesök, samt ytterligare ett par gånger under dagen, ska du skölja ren ändtarmsöppningen med handdusch.

Det är vanligt att det blöder från ändtarmsöppningen under de första veckorna efter operationen, särskilt i samband med avföring.

Du får ett recept på smärtstillande och tarmreglerande läkemedel. Det är viktigt att använda tarmreglerande medel för att hålla avföringen mjuk.

Det tar ofta 4–6 veckor innan de ytliga såren helt har läkt. Under denna period kan du ha en binda i trosan/kalsongen för att skydda kläderna.

Sjukskrivning

Sjukskrivningstiden varierar men är i allmänhet 1–3 veckor beroende på ditt arbete och operationens omfattning.

Återbesök

Du kommer på återbesök till kirurgmottagningen cirka fyra veckor efter operationen.

Kungälvssjukhus, 442 83 Kungälv
Besöksadress:
Lasarettsgatan, Kungälv
Tfn 0303-980 00
www.vgregion.se/ks