

# Information inför operation av kronisk öroninflammation

Patientinformation

Öron-, näs- och halssjukvård


Frölunda specialistsjukhus

## Information till dig som ska opereras för kronisk öroninflammation

Kronisk öroninflammation är vanligen en följd av tidigare akuta öroninflammationer. Det finns två skäl att operera, det ena är hörselförbättring och det andra är att få ett torrt öra.

### Kronisk öroninflammation

Kronisk öroninflammation är en skada i mellanörats vävnader, som vanligen orsakat av infektioner. Detta kan ha skadat de delar av örat som leder ljudet in till hörselsnäckan. Skadan kan bestå av hål på trumhinnan och/eller skada på hörselbenen.



### Operationsmetoder

De två operationsmetoder som används är lagning av trumhinnan (myringoplastik) och lagning av hörselbenen (ossikuloplastik).

#### Myringoplastik

Vid myringoplastik repareras det hål som finns på trumhinnan. Vid operationen lagas trumhinnan, oftast med en bit muskelhinna eller brosk.

#### Ossikuloplastik

Vid ossikuloplastik repareras hörselbenskedjan. Antingen används ditt eget ben eller titan.

## Operation

Operationen görs i narkos eller i lokalbedövning. Ingreppet görs antingen bakom örat eller genom hörselgången.

I hörselgången läggs tamponader indränkta i salva. Ett förband läggs över örat. Vanligen går du hem samma dag som operationen.

## Efter operationen

Oftast avlägsnas förband, tamponader och eventuella stygn efter 2 veckor.

Läkningen fortsätter under 2-3 månader och hörselförbättringen tar ofta samma tid. Återbesök sker vanligen efter 2 veckor samt cirka 6 veckor efter operationen.

### Skötsel av det opererade örat

Efter operationen skall du undvika vatten i örat innan läkningen är helt klar. De första 3 veckorna efter operationen skall kraftig fysisk ansträngning undvikas liksom att tryckutjämna i örat.

### Sjukskrivning

Du blir vid behov sjukskriven 1-2

## Komplikationer

Alla kirurgiska ingrepp innebär ett litet risktagande. Vid öronkirurgi kan detta medföra att hörseln efter operationen blir sämre. Förändring av smaksinnet på tungspetsen eller på sidan av tungan förekommer, men är vanligtvis övergående. Har man mycket sus i örat kan detta öka efter operationen men återgår vanligen till samma nivåer som innan operationen.

## Förväntat resultat

Efter myringoplastik, cirka 90 % läkt och heltrumhinna.

Efter operation av hörselbenen, ossiculoplastik, 60-70 % chans till påtaglig hörselförbättring.

veckor efter operationen.

## Telefonnummer och telefontider Frölunda Specialistsjukhus

Öron-, näs- och halsmottagningen

Telefon      **031 – 342 52 34**

Måndag - torsdag      07:15 – 16:00

Fredag                      07:15 – 13.30

(lunchstängt 12.00 – 13.00)

Vill du söka efter mer information på nätet om sjukdomar, undersökningar, behandlingar mm, besöker du sidan [www.1177.se](http://www.1177.se)

---