



مستشفى المنطقة في انجيريد
عيادة

التنظير الداخلي
قبيل الفحص الذي ستخضع له
التنظير الداخلي

ARABISKA



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN
ANGEREDS NÄRSJUKHUS

www.angeredsnarsjukhus.se/endoskopimottagning
www.facebook.com/angeredsnarsjukhus

! راجع الأدوية التي تتعاطاها

هل تتعاطى أي من هذه الأدوية؟

- فاران Waran، أبيكومارول Apekumarol، ماركومار Marcumar أو فارفاين Warfain؟ عندها يجب عليك أن تقوم في موعد لا يتعدى 7 أيام قبل موعد الفحص بالتواصل مع عيادة AK / طبيبك المعالج وذلك لتوقيف استخدام الدواء.
- بريليك Brillique، كلويدوجرل Clopidogrel، كلوريوكارد Cloriocard، يفينت Efient، جريبيد Gripid، بلافيكس Plavix أو تكليد Ticlid؟ عندها يجب عليك أن تقوم في موعد لا يتعدى 5 أيام قبل موعد الفحص بالتواصل مع عيادة AK / طبيبك المعالج وذلك لتوقيف استخدام الدواء.
- إيليكويس Eliquis، براداكسا Pradaxa، ليكسيانا Lixiana أو اكساريلتو Xarelto؟ عندها يجب عليك أن تقوم في موعد لا يتعدى يوم واحد قبل موعد الفحص بالتواصل مع عيادة AK / طبيبك المعالج وذلك لتوقيف استخدام الدواء بشكل مرقت قبل الفحص.
- أسيتيل ساليسيل سيرا Acetylsalysira، فراجمين Fragmin، إيتوهب Innohep، كليكسان Klexane أو ترومبيل Trombyl؟ عندها يجب أن تمتنع عن تعطي الدواء في نفس اليوم الذي تجري فيه الفحص.

7
أيام قبل

5
أيام قبل

1
قبل

في
نفس
اليوم

أدوية الحديد

توقف عن تعاطي أدوية الحديد 7 أيام قبل موعد الفحص. (يسري فقط على فحوصات تنظير القولون/ القولون السيني).

الإنسولين

إذا كنت تعاني من مرض السكري الذي يعالج بالإنسولين فيجب أن تقوم بتبلغنا عن ذلك. يتم في أغلب الأحيان عمل الفحوصات للشخص الذي يعاني من مرض السكري في وقت مبكر من اليوم.

الأدوية الأخرى

يجب أن تتعاطى الأدوية الأخرى كالمعتاد حتى يوم الفحص، على أي حال يجب أن تتعاطاها خلال فترة لا تقل عن ساعتين قبل موعد الفحص.

الأدوية المخففة للأوجاع / الأدوية المهدئة وسياسة السيارة

في بعض الأحيان يمكن أن يلزم إعطاء أدوية مهدئة و / أو مخففة للأوجاع خلال الفحص. بعد الفحص لا يسمح لك قيادة السيارات لمدة يوم واحد (1). لذلك فمن المهم أن تخطط قبل أن تحضر إلينا كيف سيتم توصيلك إلى المنزل بعد الفحص.

الوصفات الطبية

عند تنظير القولون السيني وتنظير القولون: توجد الأدوية التي يجب أن تتناولها قبل الفحص لاحضارها من الصيدلية في موعد لا يتعدى أسبوع واحد (1) قبل يوم الفحص.

الأدوية مجانية إذا جلبتهم من وحدة من الصيدليات التالية: ابوتيكيكس جروبن Apoteksgruppen، أبوتيا Apotea، أبوتيكيك آبي Apoteket AB، كروناس أبوتيكيك Kronans Apotek أو لويديس Lloyds الأدوية مجانية إذا جلبتهم من وحدة من الصيدليات التالية: ابوتيكيكس جروبن Apoteksgruppen، أبوتيا Apotea، أبوتيكيك آبي Apoteket AB، كروناس أبوتيكيك Kronans Apotek أو لويديس Lloyds

أهلاً وسهلاً بك في مستشفى المنطقة في انجيريد

ستتعرف في هذا الكتيب على الأشياء التي يجب أن تفعلها لكي تتأهب قبيل فحص التنظير الداخلي الذي ستخضع له لدينا.

راجع في خطاب الاستدعاء الذي حصلت عليه ما هو الفحص الذي ستخضع له. اقرأ بعد ذلك محتويات الفقرة التي تتعلق بك.

اقرأ أيضاً بدقة محتويات الفقرة التي تحمل عنوان راجع الأدوية التي تتعاطاها "Se över dina läkemedel" - يسري هذا على الجميع.

الفهرس

2	راجع الأدوية التي تتعاطاها
4	التنظير الهضمي العلوي
6	تنظير القولون
7	تنظير القولون السيني
9	PLENVU
11	VISTAPREP أو LAXABON
12	تواصل معنا

التنظير الهضمي العلوي



عن التنظير الهضمي العلوي
Gastroskopi على 1177

إن التنظير الهضمي العلوي هو فحص للمريء وكيس المعدة والاثنا عشر. يتم عمل الفحص بمساعدة أداة معكوفة تسمى المنظار الداخلي. يتم إدخاله إلى كيس المعدة عبر الفم.

يتم خلال الفحص التدقيق على غشاء المعى ويمكن أخذ عينات وتنفيذ مختلف أشكال المعالجة عند اللزوم.

إذا أرت معرفة المزيد عن التنظير الهضمي العلوي فبإمكانك قراءة معلومات عن ذلك في دليل الرعاية 1177 (Vårdguiden).

لماذا يتم عمل التنظير الهضمي العلوي؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل طبيبك يريد القيام بعمل التنظير الهضمي العلوي. يمكن أن يتعلق الأمر على سبيل المثال بأنك تعاني من حموضة أو صعوبة في البلع أو شعور بالغثيان والتقيؤ وأوجاع في المعدة وانخفاض في الوزن أو أسباب أخرى.

ولكي تكون نتيجة الفحص جيدة فمن المهم جداً أن يكون كيس المعدة فارغاً تماماً. لذلك لا يسمح لك تعاطي الطعام غير رخو 6 ساعات قبل عمل الفحص وأن لا تشرب السوائل قبل الفحص بساعتين.

يمكن أن تستثنى الأدوية من ذلك - اقرأ المزيد عن الأدوية على ص 3.

كيف يتم عمل الفحص

يتم إعطائك تخدير موضعي (رشاش) في تجويف الفم قبل الفحص، مما يسهل من إجراء الفحص.


يستغرق الفحص بضعة دقائق. خلال عمل التنظير الهضمي العلوي يمكن أن يتم أخذ عينات من الأغشية المخاطية. في هذه الحالة يتم إعطائك معلومات عن ذلك.

في أغلب الأحيان يكون بوسعك مغادرة المستشفى مباشرة بعد انتهاء الفحص. ولكن لا يسمح لك أن تتعاطى الطعام أو الشراب أو تعاطي أي أدوية قبل مرور ساعة واحدة على الأقل بعد الفحص. يعود سبب ذلك إلى أن التخدير الموضعي الذي تم إعطائه لك في الحلق يمكن أن يزيد من خطر البلع الخاطئ.

المضاعفات والمخاطر

في بعض الأحيان يمكن أن تشعر باضطراب في الحلق بعد عمل فحص التنظير الهضمي العلوي. إن هذا الشيء طبيعي جداً وينقضي بعد بضعة أيام. هذا وإن المضاعفات الناجمة عن التنظير الهضمي العلوي نادرة الوقوع.

إذا أصبت بأوجاع قوية ومستمرة خلف عظمة القص أو في البطن أو دوم في البراز بعد الفحص عليك أن تذهب إلى أقرب عيادة طوارئ.



بمساعدة التنظير الهضمي العلوي يمكن فحص كل من المريء (1)، كيس المعدة (2) والجزء العلوي من الاثني عشري (3).

تنظير القولون



عن تنظير القولون السيني
Koloskopi على 1177

إن تنظير القولون السيني هو فحص للمعي الغليظ. يتم عمل الفحص باستخدام يتم عمل الفحص بمساعدة أداة معكوفة. يتم إدخال هذه الأداة في المعى عن طريق فتحة الشرج.

يقوم الفاحص بالتدقيق على الأغشية المخاطية للمعي ويأخذ/تأخذ عينات وينفذ العديد من أشكال المعالجة إذا تطلب الأمر.

إذا أردت معرفة المزيد عن تنظير القولون فيمكنك أن تقرأ معلومات على قراءة معلومات عن ذلك في دليل الرعاية 1177 (Vårdguiden 1177).

لماذا يتم عمل تنظير القولون ؟

يمكن أن يعود سبب عمل فحص تنظير القولون مثلا عمل تحقيق عن انخفاض قيم الدم، تغير في عادات البراز، تحقيقات عن حالات الإسهال، سليلات (بوليب) أو الاشتباه بوجود ورم.

كيف يتم عمل الفحص

من المعتاد أن يستغرق الفحص 30 - 45 دقيقة.

خلال تنظير القولون يحتاج القائم على الفحص إلى نفخ هواء في المعى لكي يتمكن من الرؤية بصورة أفضل. في بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى شعور المرء بانتفاخ البطن ويمكن أن يشعر بانزعاج أو ألم.

خلال تنظير القولون يحتاج القائم على الفحص إلى نفخ هواء في المعى لكي يتمكن من الرؤية بصورة أفضل. في بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى شعور المرء بانتفاخ البطن ويمكن أن يشعر بانزعاج أو ألم.

بإمكانك أن تتعاطى الأدوية كالمعتاد بعد الفحص، إلا إذا كنت قد حصلت على توصية بشكل يخالف ذلك من الطبيب.

المضاعفات والمخاطر

من النادر جدا حدوث مضاعفات ناجمة عن تنظير القولون.

يشعر بعض الناس

يراد بعض الناس شعور بالانتفاخ والألم أو انزعاج مُحير في البطن بعد الفحص أو قليل من الدم في البراز بعد الفحص (على سبيل المثال بعد إزالة السليلات (بوليب) أو . إن هذه العوارض طبيعية جدا وتختفي بعد بضعة أيام.

إن المضاعفات الشديدة (نزيف شديد من المستقيم أو خرق في المعى (انثقاب) نادرة جدا. إذا أصبت بأوجاع شديدة في البطن أو حُمى أو نزيف شديد بعد الفحص عليك دائما أن تذهب إلى عيادة الطوارئ.

تنظير القولون السيني



عن تنظير القولون السيني
Sigmoidoskopi 1177 على 1177

إن تنظير القولون السيني هو فحص للجزء السفلي من المعي الغليظ. يتم عمل الفحص باستخدام يتم عمل الفحص بمساعدة أداة معكوفة. يتم إدخال هذه الأداة في المعي عن طريق فتحة الشرج.

يقوم الفاحص بالتدقيق على الأغشية المخاطية للمعي ويأخذ/تأخذ عينات وينفذ العديد من أشكال المعالجة إذا تطلب الأمر.

إذا أردت معرفة المزيد عن تنظير القولون السيني فبإمكانك أن تقرأ معلومات على قراءة معلومات عن ذلك في دليل الرعاية 1177 (Vårdguiden 1177).

لماذا يتم عمل تنظير القولون السيني؟

يعود سبب عمل تنظير القولون السيني على سبيل المثال إلى وجود دم في البراز أو تغير في عادات البراز أو الاشتباه بوجود ورم.

كيف يتم عمل الفحص

- من المعتاد أن يستغرق الفحص 20 دقيقة تقريبا.
- الاستعدادات باستخدام كليكس KLYX قبل الفحص يجب أن يتم تفريغ محتويات الجزء الأسفل من المعي الغليظ بمساعدة مادة مُسهلة. من المهم أن يكون المعي مفرغ تماما لكي يحصل القائم على الفحص على صورة واضحة للأغشية المخاطية.
- لذلك يجب أن تتعاطي حقنتي كليكس KLYX (حقنة شرجية) قبل حضورك إلى الفحص.
- حقنة كليكس KLYX في الأمسية السابقة للفحص.
- حقنة كليكس KLYX في صباح نفس اليوم الذي ستخضع فيه للفحص.
- يسمح لك أن تأكل وتشرب كالمعتاد.

المضاعفات والمخاطر

من النادر جدا حدوث مضاعفات ناجمة عن تنظير القولون السيني. يراود بعض الناس شعور بالانتفاخ والألم أو انزعاج مُحير في البطن بعد الفحص أو قليل من الدم في البراز بعد الفحص (على سبيل المثال بعد إزالة السليلات (بوليب) أو . إن هذه العوارض طبيعية جدا وتختفي بعد بضعة أيام. إن المضاعفات الشديدة (نزيف شديد من المستقيم أو خرق في المعي (انثقاب) نادرة جدا. إذا أصبت بأوجاع شديدة في البطن أو حُمى أو نزيف شديد بعد الفحص عليك دائما أن تذهب إلى عيادة الطوارئ.

3. في اليوم السابق للفحص

في اليوم السابق للفحص لا يسمح لك أن تأكل أي طعام، يسمح لك فقط تناول المشروبات الشفافة مثل الماء والحساء بدون قطع، عصير بدون لب الفواكه، شراب ، قهوة وشاي بدون حليب.

الساعة 19:00

امزج كيس الجرعة **1** من بلنفو Plenvu في ابريق يحتوي على 5 ديسيلتر من الماء البارد
دع المزيد لجة 10 دقائق.

صب 5 ديسيلتر من الماء من الصنبور في ابريق.

اشرب 1 ديسيلتر من مزيج بلنفو Plenvu كل 00 دقائق. أشرب مع 1 ديسيلتر من ماء الصنبور العادي. اشرب بجرعات صغيرة حتى تشرب كل شيء.

تناول قرصين من أقراص التويلاكس Toilax

4. في يوم الفحص

راجع خطاب الاستدعاء الذي حصلت عليه عن أي وقت من النهار (قبل الظهر أو بعد الظهر) ستخضع للفحص واتباع الإرشادات السارية قبل الظهر *Förmiddag* أو بعد الظهر *eftermiddag* حسب ما هو مبين أدناه

في أي وقت من النهار ستقوم بعمل الفحص؟

قبل الظهر

الساعة 07.30 – 12.00

إذا كنت ستخضع للفحص قبل الظهر افعل ما يلي
في يوم الفحص:

الساعة 05.00

امزج كيسين من الجرعتين **2A** و **2B** من بلنفو

Plenvu سويا مع 5 ديسيلتر من الماء البارد، دع

المزيج لفترة 10 دقائق ثم اشرب الكمية كلها خلال

ساعة واحدة. اشرب بجرعات صغيرة سويا مع 5

دديسيلتر من الماء العادي من الصنبور.

تناول قرصين من أقراص التويلاكس Toilax

الساعة 07.00

خذ معلق المستقيم تويلاكس Toilax

بعد الظهر

الساعة 12.30 – 16.00

إذا كنت ستخضع للفحص بعد الظهر افعل ما يلي
في يوم الفحص:

الساعة 08.00

امزج كيسين من الجرعتين **2A** و **2B** من بلنفو

Plenvu سويا مع 5 ديسيلتر من الماء البارد، دع

المزيج لفترة 10 دقائق ثم اشرب الكمية كلها خلال

ساعة واحدة. اشرب بجرعات صغيرة سويا مع 5

دديسيلتر من الماء العادي من الصنبور.

تناول قرصين من أقراص تويلاكس Toilax

الساعة 10.00

خذ معلق المستقيم تويلاكس Toilax

PLENVU بلينفو

إن بلينفو Plenvu هو دواء مسهل تأخذه لتنظيف الأمعاء قبل الفحص الذي ستخضع له. من المهم أن تتوفر لك إمكانية الذهاب إلى المرحاض بعد تناول بلينفو Plenvu لأن هذا الدواء يسبب تفريغ الأمعاء.

من المهم جداً أن تكون أمعاءك نظيفة تماماً وفارغة عند عمل الفحص.

في هذه الحالة يستغرق الفحص فترة أقصر وربما يقل الشعور بالإنزعاج. في حالة وجود محتويات في الأمعاء فيمكن أن تخفي التغيرات المرضية وفي هذه الحالة قد يلزم إعادة عمل الفحص.

نصائح

أشرب كميات وفيرة من السوائل الشفافة قدر ما تستطيع قبل وبعد تناول بلينفو Plenvu. إن المشروبات الشفافة تعني الماء والحساء بدون قطع، عصير بدون لب الفواكه، شراب، قهوة وشاي بدون حليب. اشرب المشروبات الساخنة بالسكر أو العسل إذا شعرت بالبرد أو إذا أصبت بالصداع. قم بمص حبة للحلق خلال فترة شرب بلينفو Plenvu.

من المهم جداً أن تتبع الإرشادات بالضبط كما هو مبين في البنود 1 - 4 هنا.



1. قبل الفحص بأسبوع واحد

عليك أن تمتنع عن تناول المواد الغذائية التالية في آخر أسبوع قبل المعالجة :

إذا كنت تعالج بأقرص الحديد فيجب أن تتوقف عن تناولها في موعد لا يتعدى 7 أيام قبل الفحص. عليك أن تمتنع عن تناول المواد الغذائية التالية في آخر أسبوع قبل المعالجة :

- الأطعمة التي تحتوي على كميات وفيرة من الألياف، مثل خبز الحبوب الكاملة، خليط الحبوب والفواكه المجففة (موسلي)، نخالة القمح وبذر الكتان.
- الكيوي، الحمضيات، توت العليق الأحمر، العنب
- الخضروات ذات القشور الصلبة أو البذور، مثلاً الطماطم، البقوليات، الزيتون والذرة
- المكسرات وحبوب الكينوا
- الهليون

بصورة عامة يمكن أن تأكل كالمعتاد.

إذا كنت تعالج بأقرص الحديد فيجب أن تتوقف عن تناولها في موعد لا يتعدى 7 أيام قبل الفحص. إذا كنت تتناول أدوية مضادة لتخثر الدم اقرأ الفقرة "راجع أدويةك" على الصفحة 2. بصورة عامة يمكن أن تأكل كالمعتاد حتى يومين قبل موعد الفحص.

2. قبل الفحص بيومين

لا يسمح لك أن تأكل سوى المواد الغذائية السائلة مثل الحساء الشفاف والكمبوت واللبن المخثر واللبن الزبادي.



3. اليوم السابق للفحص

لا يسمح لك أن تأكل أي شيء أبدا. يسمح لك فقط أن تشرب السوائل الشفافة. راجع خطاب الاستدعاء الذي حصلت عليه عن أي وقت من النهار (قبل الظهر أو بعد الظهر) ستخضع للفحص وتابع الإرشادات السارية قبل الظهر Förmiddag أو بعد الظهر eftermiddag حسب ما هو مبين أدناه:

في أي وقت من النهار ستقوم بعمل الفحص؟

قبل الظهر

الساعة 07.30 - 12.00

إذا كنت ستخضع للفحص بعد الظهر افعل ما يلي في يوم الفحص:

الساعة 08.00

تناول قرصين من أقراص التويلاكس Toilax

الساعة 18.00

امزج كيسين فيستابرب Vistaprep/لاكسابون Laxabon

سويا مع 2 ديسيلتر من الماء البارد ثم اشرب الكمية كلها خلال ساعة واحدة.

الساعة 20.00

تناول قرصين من أقراص التويلاكس Toilax

بعد الظهر

الساعة 12.30 - 16.00

إذا كنت ستخضع للفحص قبل الظهر افعل ما يلي في يوم الفحص:

الساعة 08.00

تناول قرصين من أقراص التويلاكس Toilax

الساعة 14.00

امزج كيسين فيستابرب Vistaprep/لاكسابون Laxabon

سويا مع 2 ديسيلتر من الماء البارد ثم اشرب الكمية كلها خلال ساعة واحدة.

الساعة 20.00

امزج كيس واحد من فيستابرب Vistaprep/لاكسابون

Laxabon سويا مع 1 ديسيلتر من الماء البارد ثم اشرب الكمية كلها خلال ساعة واحدة.

تناول قرصين من أقراص التويلاكس Toilax

4. في يوم الفحص

اتبع الإرشادات الخاصة بوقت الفحص قبل الظهر Förmiddag أو بعد الظهر eftermiddag. لا يسمح أن تأكل أي طعام مطلقا. يسمح لك شرب السوائل الشفافة فقط.

في أي وقت من النهار ستقوم بعمل الفحص؟

قبل الظهر

الساعة 07.30 - 12.00

إذا كنت ستخضع للفحص قبل الظهر افعل ما يلي في يوم الفحص:

في موعد لا يتعدى الساعة 06.00

امزج كيس واحد من فيستابرب Vistaprep/لاكسابون

Laxabon سويا مع 1 ديسيلتر من الماء البارد ثم اشرب الكمية كلها خلال ساعة واحدة.

خذ معلق المستقيم تويلاكس Toilax

بعد الظهر

الساعة 12.30 - 16.00

إذا كنت ستخضع للفحص قبل الظهر افعل ما يلي في يوم الفحص:

الساعة 08.00

امزج كيسين فيستابرب Vistaprep/لاكسابون Laxabon

سويا مع 2 ديسيلتر من الماء البارد ثم اشرب الكمية كلها خلال ساعة واحدة.

خذ معلق المستقيم تويلاكس Toilax

فيستابرب Vistaprep أو لاكسابون Laxabon

إن لاكسابون Laxabon وفيستابرب Vistaprep هي أدوية مسهلة يتم تناولها لتنظيف الأمعاء قبل الفحص الذي ستخضع له. من المهم أن تتوفر لك إمكانية الذهاب إلى المرحاض بعد تناول فيستابرب Vistaprep أو لاكسابون Laxabon لأن هذه الأدوية تسبب تفرغ الأمعاء.

من المهم جدا أن تكون أمعاءك نظيفة تماما وفارغة عند عمل الفحص. في هذه الحالة يستغرق الفحص فترة أقصر وربما يقل الشعور بالإنزعاج. في حالة وجود محتويات في الأمعاء فيمكن أن تخفي التغيرات المرضية وفي هذه الحالة قد يلزم إعادة عمل الفحص.

نصائح وحيل

لا تتواني عن شرب كميات وفيرة من المشروبات الشفافة قدر الإمكان قبل أخذ فيستابرب Vistaprep أو لاكسابون Laxabon وبعد ذلك. إن ما نقصده بالمشروبات الشفافة هو الماء والحساء بدون قطع والعصير بدون لب الفواكه والشراب والقهوة والشاي بدون حليب. لا تتواني عن شرب مشروبات ساخنة مع السكر أو العسل فيها إذا شعرت بالبرودة أو أصبت بالصداع. لا تتواني عن مص أقراص الحلوى خلال الفترة التي تشرب فيها لاكسابون Laxabon أو فيستابرب Vistaprep. يستحسن أن تمص حبة للحلوى خلال فترة شرب فيستابرب Vistaprep أو لاكسابون Laxabon.

من المهم جدا أن تتبع الإرشادات بدقة كما هو مبين في البنود 1 - 4 هنا.



1. قبل الفحص بأسبوع واحد

عليك أن تمتنع عن تناول المواد الغذائية التالية في آخر أسبوع قبل المعالجة :
إذا كنت تتعالج بأقراص الحديد فيجب أن تتوقف عن تناولها في موعد لا يتعدى 7 أيام قبل الفحص. عليك أن تمتنع عن تناول المواد الغذائية التالية في آخر أسبوع قبل المعالجة :

- الأطعمة التي تحتوي على كميات وفيرة من الألياف، مثل خبز الحبوب الكاملة، خليط الحبوب والفواكه المجففة (موسلي)، نخالة القمح وبذر الكتان.
- الكيوي، الحمضيات، توت العليق الأحمر، العنب
- الخضروات ذات القشور الصلبة أو البذور، مثلا الطماطم، البقوليات، الزيتون والذرة
- المكسرات وحبوب الكينوا
- الهليون

بصورة عامة يمكن أن تأكل كالمعتاد.

إذا كنت تتعالج بأقراص الحديد فيجب أن تتوقف عن تناولها في موعد لا يتعدى 7 أيام قبل الفحص. إذا كنت تتناول أدوية مضادة لتخثر الدم اقرأ الفقرة "راجع أدويةك" على الصفحة 2. بصورة عامة يمكن أن تأكل كالمعتاد حتى يومين قبل موعد الفحص.

2. قبل الفحص بيومين

لا يسمح لك أن تأكل سوى المواد الغذائية السائلة مثل الحساء الشفاف المخروط جيدا والكمبوت واللبن المخثر واللبن الزبادي.



Foto: Bert Leanderson

إذا كانت توجد لديك تساؤلات أو إذا جابهت مشكلات فلا تتوانى عن التواصل معنا في عيادة التنظير الداخلي. بإمكان الاتصال بنا هاتفيا أيام الاثنين - الجمعة من الساعة 07.00 - 16.00. اترك رسالة صوتية وسنصل بك هاتفيا.



1177 Vårdguiden.

في المواعيد الأخرى بإمكانك الاتصال هاتفيا بدليل الرعاية 1177 أو زيارة الموقع 1177.se

**ENDOSKOPIMOTTAGNING**

Angereds närsjukhus
Halmtorget 1
424 65 Angered

www.angeredsnarsjukhus.se/endoskopimottagning



هاتف

031 - 332 69 40



اعثر إلينا



يفشستسم ،يديريجنا يفشستسم ،سوسجنيلا يفشستسم) ذيبرغلأ ققطنملا تايفشستسم يف لعافلا طاشنلا نم ءزج وه ديريجنا يف ققطنملا يفشستسم
(فلأ جنوك يفشستسم ،يصصختلا ادنولورف



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN
ANGEREDS NÄRSJUKHUS

www.angeredsnarsjukhus.se/endoskopimottagning
www.facebook.com/angeredsnarsjukhus