



Neurologimottagning Angereds Närsjukhus, Sjukhusen i väster

Bilaga till kallelse

Ryggmärgsvätskeprov

Du är välkommen till neurologimottagningen för utförande av ryggmärgsvätskeprov (lumbalpunktion).

Blodprov ska lämnas på laboratoriet 30 minuter innan besöket.

Undersökningen är helt ofarlig. Den utföres i sidoläge då du ligger ihopkrupen med "huvudet mot knäna" eller sittande med böjd rygg. En läkare går in med en tunn nål i ländryggen för att tappa ryggmärgsvätska.

Det är viktigt att du dricker mycket vatten kvällen före och på morgonen innan undersökningen, 3-4 glas, för att minska risken att få huvudvärk efter undersökningen.

Du kan vila en stund hos oss på neurologimottagningen efter undersökningen.

Ring oss i god tid om du står på blodförtunnande medicin såsom Fragmin, Klexane, Waran, Pradaxa, Eliquis, Xarelto. Likaså om du tar proppförebyggande medicin som till exempel Trombyl, Plavix, Clopidogrel, Brilique. Dessa läkemedel måste sättas ut en viss tid innan ingreppet.

Ring också om du tar något av dessa läkemedel regelbundet/dagligen: NSAID- läkemedel (exempelvis Diklofenak, Voltaren, Ipren, Brufen, Naproxen, Pronaxen) samt Bamyil, Magnecyl och Treo.

Dessa läkemedel kan också påverka blödningsbenägenheten.