

Gäller för: Kungälv's Sjukhus

Innehållsansvar: Ann-Sofie Sirén, (annsi10), Specialsjuusköterska

Granskad av: Lars Olsson, (larol11), Överläkare

Godkänd av: Philipp Meijering, (phime1), Chefläkare

Giltig från: 2026-09-11

Giltig till: 2028-09-11

Uppehåll av Warfarin/Waran i samband med planerad operation eller undersökning, Kungälv's sjukhus

Syfte

Att säkerställa rutinen vid uppehåll av Warfarin/Waran i samband med planerad operation/undersökning som kräver ett lägre PK-värde.

Rutinens huvudbudskap är att all hantering av Warfarin i samband med planerade operativa ingrepp skall skötas via Koagulationsmottagningen på Medicinkliniken.

Vid frågor kring Warfarinuppehåll i samband med planerad operation/undersökning skall därför alltid Koagulationsmottagningen kontaktas.

Arbetsbeskrivning

Operationskoordinator skickar en bevakning till sjuksköterska på Koagulationsmottagningen om vilken operation/undersökning som ska göras, vilket datum det ska ske och önskat PK-värde om läkaren uppgett detta.

I de fall där operationskoordinator ej är inblandad (elektiva ingrepp som ex. enklare kirurgi, lumbalpunktion, benmärgsundersökning eller leverbiopsi) är den personal som bokar patienten ansvarig för att kontakta koagulationsmottagningen om tid när ingreppet ska ske. (I dessa fall viktigt att det framgår i bokningsunderlaget att patienten står på Warfarin.)

Sjuksköterska på Koagulationsmottagningen meddelar patienten från vilket datum patienten ska göra uppehåll med Warfarin. Om det är aktuellt med bridging meddelar sjuksköterskan från vilket datum

patienten ska börja med LMH. Kirurgen på inskrivningen skriver recept på LMH.

Vid mindre polikliniska operationer/undersökningar ordinerar sjuksköterskan på Koagulationsmottagningen återinsättning av Warfarin samma kväll och det står då på brevet:

”Om läkaren inte ordinerar annat ska du börja med Warfarin den...”

Efter större operationer avgör kirurgen/ortopeden när Warfarin ska återinsättas. Koagulationsmottagningen ska då kontaktas på utskrivningsdagen och tar därmed över Warfarindoseringen.

Sjuksköterska på Koagulationsmottagningen kontaktar Koagulationsansvarig läkare eller kirurgen/ortopeden vid behov.

Avgränsningar

Andra blodförtunnande preparat än Warfarin/Waran berörs EJ av denna rutin.

Ansvar

Respektive verksamhetschef /enhetschef ansvarar för att implementera rutinen och att se till att den efterlevs inom sin verksamhet/klinik/enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om det är kopplat till patient, alla avsteg från rutinen rapporteras som en avvikelse i MedControl Pro.

Relaterad information

- [Svenska sällskapet för trombos och hemostas, råd och riktlinjer.](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kungälv's Sjukhus

Innehållsansvar: Ann-Sofie Sirén, (annsi10),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Lars Olsson, (larol11), Överläkare

Godkänd av: Philipp Meijering, (phime1), Chefläkare

Dokument-ID: SV9024-2108058916-123

Version: 4.0

Giltig från: 2026-09-11

Giltig till: 2028-09-11