

Gäller för: Kirurgi-ortopedi-urologimottagning Alingsås, Kirurgi- ortopedi och

Giltig från: 2024-10-30

urologimottagning Kungälv

Giltig till: 2026-10-30

Innehållsansvar: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Granskad av: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Phimosi

Är ett fysiologiskt tillstånd under de första månaderna, många pojkar har dock kvarstående fimosis ända upp i 10-årsåldern. Barn skall i första hand inte behandlas kirurgiskt. Expektera!

Lite äldre pojkar kan behandlas med grupp III eller IV kortisonsalva. Förhuden dras tillbaka så långt som möjligt utan smärta. Salva appliceras 2 gånger dagligen på det strama området under en månad.

Därefter eventuellt återbesök för att utvärdera resultatet och vid behov planera operation.

Resultat med "kortisonbehandling" - cirka 70 procent blir bra,

Kom ihåg att påminna om att den starka kortisonsalvan inte skall användas på andra delar av kroppen, framför allt inte i ansikte.

Steroider

Grupp III

Grupp IV

Betnovat

Dermovat

Celeston valerat

Diproderm

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kirurgi-ortopedi-urologimottagning Alingsås, Kirurgi-ortopedi och urologimottagning Kungälv

Innehållsansvar: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Granskad av: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9042-122748033-158

Version: 3.0

Giltig från: 2024-10-30

Giltig till: 2026-10-30