

Gäller för: Operation Alingsås, Läkare urologi,
Kirurgi-ortopedi-urologimottagning Alingsås, Kirurgi- ortopedi och
urologimottagning Kungälv
Innehållsansvar: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef
Granskad av: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef
Godkänd av: Charlotta Claesson, (chacl1), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-27

Giltig till: 2028-05-27

Erektion vid TUR-P

Vid plötsligt tilltagande blödning under pågående transuretral resektionskirurgi eller då det blir trångt kring resektoskopet så att det är trögt att arbeta bör man misstänka erektion. Erektionen tvingar ut resektoskopet och om man inte märker det kan externa sfinktern av misstag reseceras.

Vid erektion under pågående TUR-P kan injektion av 1-2 ml Efedrin 50 mg/ml utspätt i 10 ml Nacl (5-10 mg efedrin) ges i corpus cavernosus. Kan även ges systemiskt 25 mg iv. Vid utebliven effekt kan blod evakueras med venflon om inte exspektans är att föredra.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Alingsås, Läkare urologi, Kirurgi-ortopedi-urologimottagning Alingsås, Kirurgi- ortopedi och urologimottagning Kungälv

Innehållsansvar: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Granskad av: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Godkänd av: Charlotta Claesson, (chacl1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9042-122748033-159

Version: 4.0

Giltig från: 2026-05-27

Giltig till: 2028-05-27