

Gäller för: Kirurgi- ortopedi och urologimottagning Kungälv
Innehållsansvar: Eva Philipson, (evaph), Överläkare
Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-12
Giltig till: 2027-03-12

Galloperation

Syfte

Rutinen är framtagen för att säkerställa en god och säker vård och ge ett strukturerat arbetssätt för omhändertagandet av patienterna pre- och postoperativt

Diagnoser: Gallstenar och gallblåseinflammationer

Arbetsbeskrivning

Preoperativa åtgärder

Prover:

HB, LPK, TPK, CRP, PK, APTT, Elstatus, Leverstatus, S-amylas, Blodgruppering, Bastest. EKG på alla över 65 år.

Remisser:

Läkare skriver preoperativ kolangiografi remiss. Märks akut. ([länk](#)).

Antibiotikaprofylax: ([länk](#))

Trombosprofylax: ([länk](#))

Duschinstruktioner: ([länk](#))

Information:

Gå igenom skriftlig patientinformation ([länk](#)).

Informera patienten om risk för konvertering till öppen operation samt eventuella dränage.

Informera om att han/hon kan få urinkateter under operation.

Urinkatetern tas bort i samband med att narkosen avslutas om inte operatören meddelar något annat.

Aktivitet:

Skriftlig information från sjukgymnast ([länk](#))

Nutrition: ([länk](#))

Postoperativa åtgärder

Prover:

Enligt ordination.

Läkemedel:

Enligt mall i läkemedelsmodulen.

Hud:

Eventuella dränage dras enligt läkarordination.

Dränage mäts kl. 07.00 – 07.00, dränvätskans utseende dokumenteras

Information:

Det är vanligt med smärtor i höger axel, relaterat till nervpåverkan som uppstår på grund av en retning av högersidan av diafragma.

Nutrition:

Lapgalla: får äta och dricka operationsdagens kväll.

Öppen galla: enligt läkarordination.

Elimination:

Kontroll av vattenkastningen med bladderscan. Tappningsgräns: 400 ml.

Återbesök:

Öppen galla: Återbesök 4–6 veckor postoperativt till operatören, eller enligt läkarordination. Leverstatus tas en vecka innan återbesöket.

Uppföljning:

Remiss till distriktssköterska för eventuell suturtagning 10 – 12 dagar postoperativt.

Vårdtid:

Oftast poliklinsk operation

Inneliggande lapgalla: 0–2 dygn

Öppen galla: 3–4 dygn

Ansvar

Klinikens läkare, sjuksköterskor och undersköterskor skall känna till rutinen. MLA och VEC ansvarar för att rutinen blir känd. Avsteg rapporteras i MedControl PRO

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kirurgi- ortopedi och urologimottagning Kungälv

Innehållsansvar: Eva Philipson, (evaph), Överläkare

Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9042-122748033-19

Version: 8.0

Giltig från: 2025-03-12

Giltig till: 2027-03-12