

Gäller för: Kirurgi- ortopedi och urologimottagning Kungälv
Innehållsansvar: Malte Norström, (malno2), Överläkare
Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-06

Giltig till: 2026-11-06

Lokalanestetika vid ljumskbråck

Syfte

Rutinen beskriver teknik för kombinerad lednings- och infiltrationsanestesi vid ljumskbråckskirurgi.

Arbetsbeskrivning

Bedövning/blockad läggs med fördel på UVA minst 15 minuter före operationsstart. Totalvolym ca 40 ml (enligt nedan) blandas försiktigt i en plastskål eller direkt i större spruta:

1. 18-20 ml 0,5% Marcain
2. 18-20 ml 1% Carbocain med adrenalin
3. 4 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml

Patienten tvättas och rakas. Bedövningen läggs sterilt och fördelas med ca 15 ml medialt om SIAS alldeles under externusaponeurosen, ca 7 ml vid kraniolaterala hörnet av os pubis samt resterande del subkutant i tänkta operationsområdet.

Peroperativt kan man komplettera med 0,5% Carbocain utan adrenalin, som vid behov läggs vid bråcksäckshalsen samt i funikeln.

Ansvar

MLA Kirurgi ansvarar för uppföljning och revision av rutinen. MLA Kirurgi samt handledande kirurger skall sprida kunskap om rutinen på kliniken. Avsteg rapporteras i MedControl PRO.

Historik

Version	Punkt	Ändring	Utförare	Datum
5	5.1	Uppdaterat giltighetsdatum i och med migrering STY SOFIA	Verksamhetsassistent Kir/Ort	2021-11-04
6		Korrigerig av metadata för att säkerställa hittbarhet i hittadokument.vgregion.se	Projektledare implementering STY SOFIA SV	2022-06-02

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kirurgi- ortopedi och urologimottagning Kungälv

Innehållsansvar: Malte Norström, (malno2), Överläkare

Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9042-122748033-33

Version: 10.0

Giltig från: 2024-11-06

Giltig till: 2026-11-06