

Gäller för: Kirurgi- ortopedi och urologimottagning Kungälv  
Innehållsansvar: Roger Fågelqvist, (rogfo1), Överläkare  
Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-17

Giltig till: 2027-01-16

# Subkutan venport (port-a-cath)

## Syfte

Information för att säkerställa en god och säker vård för patienter med subkutan venport.

## Arbetsbeskrivning

Vi följer Vårdhandboken ([länk](#)) men har även lokala anvisningar enligt nedan:

### Inläggning:

Remiss för inläggning.

Prover: Hb, LPK, TPK, PK, APTT.

Nutrition

Duschinstruktioner

Antibiotika enligt ordination.

### Vid handhavande av subkutan venport:

Följ noggrant instruktionerna i vårdhandboken.

Spola med NaCl 9 mg/ml. För en vuxen person är 40 ml den normala mängden, den kan justeras av läkare om patienten har vätskerestriktion.

**Heparin behöver alltså inte användas** eftersom det vetenskapliga stödet är svagt.

## Ansvar

Alla klinikens läkare och sjuksköterskor skall känna till denna rutin.

MLA och VEC ansvarar för att rutinen blir känd.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Kirurgi- ortopedi och urologimottagning Kungälv

**Innehållsansvar:** Roger Fågelqvist, (rogfo1), Överläkare

**Godkänd av:** Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SV9042-122748033-58

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-01-17

**Giltig till:** 2027-01-16