

Gäller för: Kirurgi-ortopedi-urologimottagning Alingsås, Kirurgi- ortopedi och urologimottagning Kungälv  
Innehållsansvar: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef  
Godkänd av: Charlotta Claesson, (chacl1), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-01-26

Giltig till: 2028-01-26

# Uretäroskopi och stenextraktion

## Syfte

Informationen är framtagen för att säkerställa en god och säker vård och ge ett strukturerat arbetssätt för omhändertagandet av patienterna pre-och postoperativt

## Arbetsbeskrivning

### Preoperativt

Prover: Urin-odling. Övriga prover enbart utifrån operatörens ordination.

MRSA om patienten vårdats i riskområde senaste 12 månaderna.

Längd, vikt, blodtryck, puls, saturation på alla patienter.

EKG på alla patienter över 65 år och riskpatienter.

Trombosprofylax enligt ordination om lång operationstid.

Preoperativa tvätt rutiner: Dubbeldusch med desinfektionsmedel x 1, enligt

Vårdhygien ([länk](#))

Preoperativ fasta: enligt PM ([länk](#))

Antibiotika enligt läkarordination.

Preoperativ datortomografi utförs inom en vecka före operationen om anmälande läkare bedömer som relevant.

Sidomarkeras på preop

## Preoperativ patientinformation

Görs i spinalbedövning eller narkos.

## Operation

Inför operationsstart säkerställs samma sida anges av operatör, sidomarkering och operationsanmälan.

Läkaren går in via urinröret in i blåsan och upp i uretären med ett uretroskop och plockar ut eller sönderdelar stenen. Ibland läggs en dubbel-pigtailkateter efter lithotripsin som avlastning.

Operationstid 30 – 90 minuter.

## Postoperativt

Patienten ligger på UVA några timmar.

Urinelimination: KAD dras efter några timmar eller enligt ordination, om urinen är klar och patienten feberfri.

Kontrollera vattenkastningen. Hematuri och trängningar kan förekomma postoperativt.

Stenarna skickas på analys.

Nutrition: Patienten får äta efter operationen.

## Information inför utskrivning

En inlagd dubbel-pigtail ger ofta ökade trängningar och ibland hematuri.

## Uppföljning

Efter 1-2 veckor avlägsnas dubbel-pigtailkatetern vid ett mottagningsbesök.

Urografik kontroll efter cirka 4 veckor.

Eventuell sjukskrivning 1-2 veckor.

## Ansvar

All vårdpersonal skall arbeta efter denna rutin.

## Relaterad information

Tagit från PM på SU/Sahlgrenska.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Kirurgi-ortopedi-urologimottagning Alingsås,  
Kirurgi- ortopedi och urologimottagning Kungälv

**Innehållsansvar:** Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

**Godkänd av:** Charlotta Claesson, (chacl1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SV9042-122748033-68

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2026-01-26

**Giltig till:** 2028-01-26