

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad

Innehållsansvar: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-07

Giltig till: 2027-01-07

# Ljumskbråck – operation i lokalbedövning

## Preoperativt:

Operatören eller operationssköterskan iordningställer lokalanestetika rent. Detta ges på operationssalen innan sterilklädning och då ska patienten vara uppkopplad med övervakning av EKG, blodtryck och saturationsmätning.

Följande blandning av lokalanestetika ska ges:

- Ropivakain (Narop) 5 mg/ml, 20 ml.

## Perioperativt:

Blandning av samma lokalanestetika skall även iordningställas sterilt av operationssköterskan för att användas perioperativt, det vill säga:

- Ropivacain (Narop) 5 mg/ml, 20 ml.

Anestesiläkare ordinerar sedering på den preoperativa bedömningsblanketten.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Sjukhusen i väster, Operation Alingsås,  
Kirurgiavdelning Alingsås, Kirurgi-ortopedi-urologimottagning  
Alingsås, Kirurgi och ortopedi, Alingsås Lasarett

**Innehållsansvar:** Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

**Godkänd av:** Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SV9042-122748033-87

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-01-07

**Giltig till:** 2027-01-07