

Gäller för: Kirurgiavdelning Alingsås, Kirurgi-ortopedi-urologimottagning

Giltig från: 2025-01-07

Alingsås

Giltig till: 2027-01-07

Innehållsansvar: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Granskad av: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Skriftliga generella direktiv

Enligt SOSFS 2001:17 får läkemedel utdelas av sjuksköterska genom generella direktiv. Detta måste ske med stor restriktivitet och läkare ta ställning till eventuell fortsatt läkemedelsbehandling

Given dos ska registreras i läkemedelsjournal och vårddokumentation.

Indikation	Läkemedel	Normaldos	Antal tillfällen	Max dos	Kontraindikation/ Anmärkning
Illamående/ kräkningar	T.Postafen 25 mg	1 tablett	Max x 2	2 st	Maxdos per dygn 50 mg
Illamående	Inj Dridol 2,5mg/ml	0,5 ml intravenöst	Max x 4	2 ml	Dosen kan upprepas efter 30 min Ej vid neuropsyk sjukdom utan ordination.
Illamående	T. Zofran munlösning 4 mg	1 tablett	Max x 3	3 st	Om Dridol inte fungerar. Total maxdos ondansetron 32 mg/d
Kräkningar	Inj Ondansetron 2 mg/ml	4 mg intravenöst = 2 ml	Max x 3	6 ml	Om tablett Zofran inte hjälper. Total maxdos ondansetron 32 mg/d
Epigastralgi/ halsbränna	T. Novalucol	1-2 tabletter	Max x 4	8 tst	
Tillfällig förstoppning	Dr. Cilaxoral, 7,5 mg/ml	10-20 droppar	Max x 1	20 dr	Ej vid misstanke om ileus.

Rektum-obstipation	Resulax klyσμα, 8,5 mg	1 st	Max x 2	2 st	Ej vid misstanke om ileus.
Obstipation	Dulcolax supp	1 st	Max 1	1 st	Ej vid misstanke om ileus.
Känd kärlkramp/angina pectoris.	Nitromex resoriblett 0,25 mg	1-2 resoribletter sublinguallt vid anfall	Max x 4	8 st	Kontakta juren om det ej hjälper - innan nästa dos ges.
Smärta	T. Panodil 500 mg	1-2 tabl.	Max x 4	8 st	Kan ges var 6:e timma. Totala dosen paracetamol får ej överstiga 4 g/dygn.
Smärta	Supp Alvedon 1g	1 stolpiller	Max x 4	4 st	Den totala dosen paracetamol får inte överstiga 4 g/dygn
Indikation	Läkemedel	Normaldos	Antal tillfällen	Max dos	Kontraindikation/ Anmärkning
Smärta	Inf Paracetamol 10 mg/ml	1 g	Max x 4	4 g	Kan ges var 6:e timma. Totala dosen paracetamol får ej överstiga 4 g/dygn.
Smärta	Inj OxyNorm 10mg/ml	0,5 ml sc	Max x 4	20 mg	Vid upprepade eller täta behov kontakta läkare. EJ till pat med EDA
Vid postop smärta enligt särskilt PM	OxyNorm iv.	1-2 mg intravenöst,			Endast första dygnet postop! Ej vid EDA.
Insomnings-svårigheter	T. Zopiklon 5 mg	1-2 tabl. omedelbart före sänggåendet	Max x 1	2 st	Risk för tillvänjning
Nästappa	Nezeril endospipett 0,5 mg/ml	2 doser	Max x 3	6 doser	Ej behandling > 1v utan att rådfråga läkare
Hosta	Mixt Mollipect 0,5 mg/ml	15 ml	Max x 4	60 ml	Slemlösande, bronkdilaterande
Hosta/slemlösande	Brus T Acetylcystein 200 mg	1 vid behov	Max x 3		
Oro	T.Oxascand 5 mg	1 tabl.	Max x 2	2 st	Vid upprepat behov bör

					insättning av läkare efterfrågas.
Oro	T Stesolid 5 mg	1 tabl	Max x 2	2 st	
Oro	Kaps. Heminevrin 300 mg	1 st	Max x 2	2 st	Total maxdos heminevrin 900 mg
Oro	Oral lösning Heminevrin 50 mg/ml	3-6 ml vid behov	Max x 2	12 ml	Total maxdos heminevrin 900 mg
Krampanfall	Diazepam rektallösn	5 mg	Max x 2	10 mg	
Preoperativt Fortsättning av pågående infusion i väntan på rond	Glukos 100 mg/ml 40 Na 20 K	1000 ml	Max x 1	1000 ml	Obs! Elstatus normalt? Infusionshastighet 8-12- timmar.

Indikation	Läkemedel	Normaldos	Antal tillfällen	Max dos	Kontraindikation / Anmärkning
Till patient med diabetes enligt PM	Glucos 50 mg/ml Na 40 K 20	1000 ml	Max x 1	1000 ml	Enligt PM till insulinbeh diabetiker
Fortsättning på infusionschema i väntan på rond	Plasmalyte/ Ringer-Acetate	1000 ml	Max x 1	1000 ml	
Förstoppning	Moxalole till oral lösning	1 dos	Max x 2	2 doser	Ej vid ileusmisstanke
Förstoppning	Laktulos 670 mg/ml	10-30 ml	Max x 2	40 ml	Ej vid ileusmisstanke
Anal/rektal smärta	Xyloproct supp	1 st	Max x 3	3 st	
Röksug	Nicotinell depot-plåster 14 mg/24 h	1 st	Max x 1	1 st	Till rökare < 20 cig /d
Röksug	Nicotinell depot-plåster 21 mg/24 h	1 st	Max x 1	1 st	Till rökare >20 cig /d
Röksug	Nicotinell depot-plåster 7 mg/24 h	1 st	Max x 1	1 st	Vid nedtrappning

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Halsbränna/ epigastralgi	Xylocain viskös 20 mg/ml	10 ml	Max x 2	20 ml	
-----------------------------	--------------------------------	-------	---------	-------	--

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kirurgiavdelning Alingsås, Kirurgi-ortopedi-urologimottagning Alingsås

Innehållsansvar: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Granskad av: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9042-122748033-93

Version: 3.0

Giltig från: 2025-01-07

Giltig till: 2027-01-07