

# Nålfasciotomi

## Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

## Bakgrund och syfte

Instruktion nålfasciotomi.

## Utförande

Besökstid: 45 min, ska sambokas med handteamet för skena efteråt.

Läkemedel: Injektionsvätska Carbocain 20 mg/ml

Injektionsvätska Depo-Medrol 40 mg/ml

Klorhexidinsprit + osterila kompresser

- 1 rosa kanyl
- 4 orange kanyler
- 1 spruta 2,4 ml

Sterila handskar till kirurg

ViTri snabbförband

1 paket runda tork

71 Mepitel 5 x 5 (ska ej öppnas, endast vid behov)

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Patienten tvättar handen med Descutansvamp i 3 minuter.

Läkaren tvättar patientens hand med Klorhexidinsprit.

Läkaren drar upp 1 ml Depodmedrol och 1 ml Carbocain i sprutan.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Sjukhusen i väster, Kirurgi-ortopedi-urologimottagning Alingsås

**Innehållsansvar:** Susanna Peters, (suspe18), Specialistläkare

**Godkänd av:** Charlotta Claesson, (chacl1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SV9043-22965278-155

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-10-10

**Giltig till:** 2027-10-10