OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Kirurgi- ortopedi och urologimottagning Kungälv
Innehållsansvar: Linn Åkerstedt, (linak3), Överläkare
Godkänd av: Charlotta Claesson, (chacl1), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-09-14
Giltig till: 2028-08-31

Antibiotikaprofylax vid tandingrepp efter protesoperation

Syfte

Skapa enhetlig rutin för rekommendation angående antibiotikaprofylax vid tandingrepp efter protesoperation.

Arbetsbeskrivning

Patienten skall helst undvika planerade invasiva tandingrepp de tre första månaderna efter proteskirurgi. Antibiotikaprofylax före tandingrepp (tandextraktion, tandstensskrapning eller dentoalveolär kirurgi) hos patient som har inopererad ledprotes rekommenderas om patienten

- är protesopererad de senaste tre månaderna
- har minst tre av nedanstående riskfaktorer

- Övervikt med BMI >35
- Rökare
- Anemi
- Dålig munhälsa
- Primär eller förvärvad immunbrist
- Allmän sjuklighet med ASA-klass 3 eller mer
- Hög ålder (>80-85 år)
- Långvariga käkingrepp

Antibiotikaval:

- Amoxicillin 2 g peroralt som engångsdos 60 minuter före ingreppet.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

- Vid penicillinallergi ges Klindamycin 600 mg peroralt som engångsdos.

Ansvar

Innehållsansvarig ansvarar för att rutinen revideras.
MLA/verksamhetschef ansvarar för att rutinen följs. Avsteg rapporteras i MedControl PRO.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kirurgi- ortopedi och urologimottagning Kungälv

Innehållsansvar: Linn Åkerstedt, (linak3), Överläkare

Godkänd av: Charlotta Claesson, (chacl1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9043-22965278-4

Version: 7.0

Giltig från: 2026-09-14

Giltig till: 2028-08-31