

Gäller för: Kirurgi- ortopedi och urologimottagning Kungälv
Innehållsansvar: Linn Åkerstedt, (linak3), Överläkare
Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-09

Giltig till: 2026-10-09

Antibiotikaproylax vid tandingrepp efter protesoperation

Syfte

Skapa enhetlig rutin för rekommendation angående antibiotikaproylax vid tandingrepp efter protesoperation.

Arbetsbeskrivning

Antibiotikaproylax före tandingrepp (tandextraktion, tandstensskrapning eller dentoalveolär kirurgi) hos patient som har inopererad ledprotes rekommenderas om patienten

- är protesopererad de senaste tre månaderna
- har minst tre av nedanstående riskfaktorer
- Övervikt med BMI >35
- Rökare
- Anemi
- Dålig munhälsa
- Primär eller förvärvad immunbrist
- Allmän sjuklighet med ASA-klass 3 eller mer
- Hög ålder (>80-85 år)
- Långvariga käkingrepp

Antibiotikaval:

- Amoxicillin 2 g peroralt som engångsdos 60 minuter före ingreppet.
- Vid penicillinallergi ges Klindamycin 600 mg peroralt som engångsdos.

Ansvar

Innehållsansvarig ansvarar för att rutinen revideras.

MLA/verksamhetschef ansvarar för att rutinen följs. Avsteg rapporteras i MedControl PRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kirurgi- ortopedi och urologimottagning Kungälv

Innehållsansvar: Linn Åkerstedt, (linak3), Överläkare

Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9043-22965278-4

Version: 6.0

Giltig från: 2024-10-09

Giltig till: 2026-10-09