

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2026-03-20

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2028-03-20

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef


B19:PO Buk mk (tunntarm)

Förändringar sedan föregående version

Inga.

Metodbeskrivning	
Us kod/Us namn	847800 DT tunntarm med iv kontrast
Indikation	Utredning av inflammatorisk tarmsjukdom när MR inte är lämpligt. Utredning av tunntarmstumörer.
Serieöversikt	1. Buk mk (peroral kontrast)
Förberedelser	Patient skall vara fastande 4 timmar före undersökningen. Patienten dricker peroralt kontrastmedel jämnt fördelat under 45 minuter, med start 1 timma före undersökningen. Avlägsna all metall från bröstnivå ner till ljumskar.
Patientpositionering	Ryggläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet.
Patientcentrering	XY

Scouter	Frontal och lateral.
Kontrastmedel	Peroral kontrastmedelsblandning 30 ml Sorbitol i 1000 ml vatten Intravenöst kontrastmedel Omnipaque (350 mg I/ml) intravenöst. Anpassa dosen enligt vikt i OmniJect.
Kontrastmedelsprotokoll	Buk (venfas) Välj protokoll utefter vald kV.
Injektionstid	35 sekunder
Kontrastmedelsfördröjning	60 sekunder
Läkemedel	-
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
Strålskydd	Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För mer information: Strålskydd patient .

Scanområde/kriterier		
Serie 1		
Hela buken mk (60 sekunder)		
		
<i>Fr.o.m. strax ovan diafragma t.o.m. trochanter minor.</i>		

Relaterade dokument
Kontrastmedelsdoser utefter kV vid datortomografiundersökningar – Alingsås
Kontrastmedelsdoser utefter kV vid datortomografiundersökningar – Angered, Högsbo och Kungälv
Kontrastmedelsblandningar i samband med datortomografi-undersökningar, Radiologi – Sjukhusen i väster
Flödesschema för riskbedömning av kontrastmedelsinducerad akut njurskada vid datortomografiundersökningar
Kreatinin inför en datortomografiundersökning med intravenöst kontrastmedel
Prioriteringskoder för datortomografi – Radiologi, Sjukhusen i väster

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1198013067-113

Version: 2.0

Giltig från: 2026-03-20

Giltig till: 2028-03-20