

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2025-11-13

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2027-11-13

Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

N11 Urinvägar mk (utsöndringsfas) – Alingsås lasarett

Förändringar sedan föregående version

Inga.

Metodbeskrivning

Us kod/Us namn	852800 DT urografi med iv kontrast
Indikation	Visualisering av uretärer, t.ex. vid svårighet att avgöra läget av ett konkrement/förkalkning
Serieöversikt	1. Utsöndringsfas (15 minuter)
Förberedelser	Patienten injiceras med iv kontrastmedel 15 minuter före undersökningen. Efter kontrastmedelsinjektionen skall patienten dricka ett par muggar vatten. Innan bildtagning <ul style="list-style-type: none">• Sätt PVK i armveck• Avlägsna all metall från bröstnivå ner till ljumskar
Patientpositionering	Ryggläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet

Patientcentrering	XY
Scouter	Frontal och lateral
Kontrastmedel	Omnipaque (350 mg I/ml) intravenöst
Kontrastmedelsprotokoll	Alingsås: Utsöndring urinvägar
Injektionstid	20 sekunder
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
Strålskydd	Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För mer information: Strålskydd patient .

Scanområde/kriterier

Serie 1:

Utsöndringsfas mk (15
minuter)



*Fr.o.m. vänster diafragmavalv
t.o.m. symfys.*

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1198013067-51

Version: 3.0

Giltig från: 2025-11-13

Giltig till: 2027-11-13