

Gäller för: Radiologimottagning Angered

Giltig från: 2025-05-12

Innehållsansvar: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Giltig till: 2027-05-12

Granskad av: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Åtgärds kort kontrastmedelsutlösta lätta reaktioner – Radiologimottagning, Angered's närsjukhus

LÄTTA REAKTIONER

Enstaka kräkning, kliande urtikaria isolerad, ABCD utan anmärkning.

Röntgensjuksköterska	Röntgenläkare
Lugnt omhändertagande Kontakta dagbakjour/jour 98207 Kontrollera iv infart	Ta ställning om patient behöver bedömning på vårdcentral
Vb ge: Tabl Caredin 5 mg 2 st vid ordination (munsönderfallande)	Vb ordinera: Tabl Caredin 5 mg 2 st (munsönderfallande)
Noggrann observation i minst 30 min (på röntgenavdelningen alt vårdcentralen)	

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologimottagning Angered

Innehållsansvar: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Granskad av: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1469236134-116

Version: 3.0

Giltig från: 2025-05-12

Giltig till: 2027-05-12