

Gäller för: Radiologimottagning Angered

Giltig från: 2025-05-12

Innehållsansvar: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Giltig till: 2027-05-07

Granskad av: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Åtgärds kort kontrastmedelsutlöst anafylaktisk reaktion

ANAFYLAKTISK REAKTION

Blekhet, kallsvett, illamående, urtikaria, svullnadskänsla i hals, andnings-
svårighet, ödem, tackycardi, blodtrycksfall, medvetandesänkning, andnings-
stillestånd och cirkulationskollaps.

Röntgensjuksköterska	Röntgenläkare
<p>Ambulanslarm 112 Ring anestesijuksköterska 072-228 25 88 Kontrollera iv infart Kontakta dagbakjour/jour 98207</p> <p>Generell ordination: Adrenalinpenna 0,3 mg/dos i.m Kan upprepas efter 5-10 min</p> <p>Ge: Syrgas 10 lit/min Förbered: Inf RingerAcetat iv Förbered: 2 ml Inj Betapred 4 mg/ml iv</p> <p><i>Vid bronkospasm</i> Ta fram: Ventoline Evohaler Kan upprepas vb efter 10 min</p>	<p>Säkerställ att epipen givits (enligt generell ordination), annars ordinera.</p> <p>Ordinera: Syrgas 10 lit/min Ordinera: Inf RingerAcetat iv Ordinera: 2 ml Inj Betapred 4 mg/ml iv</p> <p>Ordinera: Ventoline 1-2 inhalationer Kan upprepas vb efter 10 min</p>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologimottagning Angered

Innehållsansvar: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Granskad av: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1469236134-117

Version: 2.0

Giltig från: 2025-05-12

Giltig till: 2027-05-07