

Gäller för: Radiologi Kungälv

Giltig från: 2025-09-17

Innehållsansvar: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Giltig till: 2027-09-17

Granskad av: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

# Åtgärds kort

## kontrastmedelsutlösta reaktioner Kungälv Sjukhus

### Lätta reaktioner

Enstaka kräkning, kliande urtikaria isolerad, ABCD utan anmärkning.

Röntgensjuksköterska	Röntgenläkare
Lugnt omhändertagande Kontakta dagbakjour/jour 07.30-22.00 Kontakta remitterande enhet 22.00-07.30 Kontrollera iv infart  <b>Vb ge:</b> Tabl Caredin 5 mg 2 st vid ordination (munsönderfallande)  <b>Noggrann observation i minst 30 min</b> (på röntgenavdelningen alt akuten)	Ta ställning om patient behöver gå till akuten       <b>Vb ordinera:</b> Tabl Caredin 5 mg 2 st (munsönderfallande)

**Dagbakjour/jourtelefon 98 207**

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologi Kungälv

**Innehållsansvar:** Leif Torén, (leito1), Enhetschef

**Granskad av:** Leif Torén, (leito1), Enhetschef

**Godkänd av:** Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SV9045-1469236134-133

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2025-09-17

**Giltig till:** 2027-09-17