

Gäller för: Radiologimottagning Högsbo

Giltig från: 2026-06-04

Innehållsansvar: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Giltig till: 2028-06-04

Granskad av: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Åtgärds kort kontrastmedelsutlöst anafylaktisk reaktion Högsbo Närsjukhus

Anafylaktisk reaktion

Blekhets, kallsvett, illamående, urtikaria, svullnadskänsla i hals, andningssvårighet, ödem, tackycardi, blodtrycksfall, medvetandesänkning, andningsstillestånd och cirkulationskollaps.

Röntgensjuksköterska	Röntgenläkare
Ambulanslarm 112 Kontrollera iv infart Kontakta dagbakjour/jour i Alingsås på tel 0322-22 66 49 Generell ordination: Epipen 300 mikrogram i.m Kan upprepas efter 5-10 min Ge: Syrgas 10 lit/min Förbered: Inf RingerAcetat iv <i>Vid bronkospasm</i> Ta fram: Ventoline Evohaler Kan upprepas vb efter 10 min	 Ordinera: Syrgas 10 lit/min Ordinera: Inf RingerAcetat iv Ordinera: Ventoline 1-2 inhalationer Kan upprepas vb efter 10 min

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologimottagning Högsbo

Innehållsansvar: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Granskad av: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1469236134-142

Version: 8.0

Giltig från: 2026-06-04

Giltig till: 2028-06-04