

Gäller för: Radiologimottagning Alingsås

Giltig från: 2026-03-18

Innehållsansvar: Nataliya Wessling, (natwe2), Överläkare

Giltig till: 2028-03-18

Granskad av: Nataliya Wessling, (natwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Åtgärdskort: Kontrastmedelsutlöst anafylaktisk reaktion på Radiologimottagningen, Alingsås lasarett

ANAFYLAKTISK REAKTION

Blekhet, kallsvett, illamående, urtikaria, svullnadskänsla i hals, andningssvårighet, ödem, takycardi, blodtrycksfall, medvetandesänkning, andningsstillestånd och cirkulationskollaps.

Röntgensjuksköterska	Radiolog
<p>Generell ordination: Epipen i.m. (kan upprepas var 5–10 min)</p> <p>Hjärtlarma på tel. 6111 och tillkalla övrig personal</p> <p>Hämta defibrillator och akutvagn</p> <p>Ge: syrgas på mask (10 L/min)</p> <p>Höj fotändan vid blodtrycksfall</p> <p>Kontrollera/säkra i.v. infart</p>	

<p>Förbered: Plasmalyte i.v. (500 mL bolus för vuxna och 10–20 mL/kg för barn <20 kg)</p> <p>Förbered: Betapred (4 mg/mL)</p> <p>Koppla på defibrillator (snarast efter 1: a injektionen)</p>	<p>Ordinera: Plasmalyte i.v.</p> <p>Ordinera: 2 ml Betapred (4 mg/mL) i.v.</p> <p>Barn <6 år 1 mL (dvs. 4 mg)</p>
--	--

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologimottagning Alingsås

Innehållsansvar: Nataliya Wessling, (natwe2), Överläkare

Granskad av: Nataliya Wessling, (natwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1469236134-216

Version: 2.0

Giltig från: 2026-03-18

Giltig till: 2028-03-18