

Gäller för: Operation Alingsås

Giltig från: 2025-11-07

Innehållsansvar: Magni Gudmundsson, (maggu10), Överläkare

Giltig till: 2027-11-07

Godkänd av: Per Werner Möller, (permo7), Enhetschef

Preoperativ premedicinering (smärtlindring)

Utförande

Artroskopi, knä, axel, handled	T. Alvedon 500mg, 2st. T. Ibuprofen 400mg.
Akromionplastik (utan blockad)	T. Alvedon 500mg, 2st. T. Ibuprofen 400mg.
Annan ortopedisk dagkirurgi	T. Alvedon 500mg, 2st.
Korsbandsplastik (Adductor-blockad)	T. Alvedon 500mg, 2st.
Galloperation	T. Alvedon 500mg, 2st.
Urologisk dagkirurgi	T. Alvedon 500mg, 2st.
TUR-P	T. Alvedon 500mg, 2st.
TUV-P	T. Alvedon 500mg, 2st.
Gynoperationer	T. Alvedon 500mg, 2st. T. Ibuprofen 400mg.
Ljumsnbräck	T. Alvedon 500mg, 2st. T. Ibuprofen 400mg.
Anala ingrepp	T. Alvedon 500mg, 2st. T. Ibuprofen 400mg.
Scrotala ingrepp	T. Alvedon 500mg, 2st.
Varicer	T. Alvedon 500mg, 2st. T. Ibuprofen 400mg.

Patienter som får blockad (annat än adductor) behöver i regel ingen premedicinering.

Kontraindikationer mot
T. Ibuprofen

Känd allergi mot NSAID, magsår,
kranskärslsjukdom, njursvikt, inflammatorisk
tarmsjukdom, ålder över 70 år.

Kontraindikationer mot T. Alvedon	Allvarlig leversjukdom
--------------------------------------	------------------------

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Alingsås

Innehållsansvar: Magni Gudmundsson, (maggu10), Överläkare

Godkänd av: Per Werner Möller, (permo7), Enhetschef

Dokument-ID: SV9761-782711715-1086

Version: 2.0

Giltig från: 2025-11-07

Giltig till: 2027-11-07