

Gäller för: Operation Alingsås

Giltig från: 2024-08-30

Innehållsansvar: Malin Ahlgren, (malah12), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-08-30

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Magni Gudmundsson, (maggu10), Överläkare

Hexvix-instillation

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Bakgrund och syfte

Hexvix är ett diagnostiskt medel som instilleras i urinblåsan för att lättare se tumörer. Resultatet är att tumörceller lyser röda till skillnad från normala celler som är blå. Hexvix har endast effekt tillsammans med blått ljus.

Patienten ska helst inte ha en pågående urinvägsinfektion i samband med Hexvix-instillationen, men efter samtal med ansvarig urolog behövs ingen urinsticka tas och patienten får Hexvix och opereras ändå.

Blåsan måste även vara tom då instillationen görs. Patienter som berörs är de med nyupptäckt blåscancer och multipla tumörer.

Syftet är att skapa en rutin/PM för säker hantering vid instillation av Hexvix.

Vilka berörs

All personal på Operation Alingsås lasarett.

Utförande

Instillationstid

Hexvix skall helst vara kvar i blåsan en timme efter instillation och patienten kissar därefter. Om patienten inte klarar att behålla Hexvix i en timme räcker det med 15 minuter. Tiden mellan instillation och operation måste ändå vara mer än en timme.

Om patienten är oförmögen att hålla läkemedlet/urin i blåsan kan ett alternativ vara att sätta en vanlig kateter, instillera läkemedlet via den och sedan klampa katetern under 1h. Men då det ej finns vanlig luerlock fattning till vanlig kateter kan man behöva dra upp läkemedlet i en vanlig spolspruta för att inistillera.

Tillvägagångssätt

Patienten skall vara ombytt till operationskläder. Sedan tas patienten till den preoperativa enheten för att kunna förberedas inför operation. Personal på preop kan lägga hexvix direkt när patienten kommit. Urinsticka är ej nödvändigt att kontrollera.

Alla moment skall utföras med ren utrustning och antiseptiska rutiner. Hexvix-instillationen görs med engångskateter med luer-lockkoppling enligt ren rutin.

- Tvätta med Hibiscrub
- Lägg bedövning som vid vanlig tappning/katetersättning (under tiden den verkar kan man blanda hexvix enligt instruktionen och förbereda katetern med NaCl.)
- För in tappningskatetern och töm blåsan helt på urin, och sedan instillera Hexvix via katetern i blåsan, låt sprutan sitta kvar på kateterna och dra sedan ur katetern ur blåsan

Dokumentation

Dokumentation av Hexvix-instillationen sker i Orbit under fliken Checklistor i rutan för premedicinering, Annat läkemedel. Viktigt att tiden skrivs in när instillationen gjordes.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Alingsås

Innehållsansvar: Malin Ahlgren, (malah12), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef, Camilla Lindberg, (camli2), Sektionsledare

Godkänd av: Magni Gudmundsson, (maggu10), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-1126

Version: 1.0

Giltig från: 2024-08-30

Giltig till: 2026-08-30