

# Generella direktiv om läkemedelsbehandling

Förändringar sedan föregående version  
Nytt dokument.

## Utförande

Endast läkare får ordinera läkemedel enligt generella direktiv (GO). Ordinationen omfattar läkemedel som får ges av sjuksköterska efter behovsbedömning utan kontakt med läkare. Sjuksköterskan ska kontrollera indikation och kontraindikationer, att överkänslighet inte föreligger samt att aktuellt läkemedel inte redan är ordinerat eller nyligen utsatt. Sjuksköterskan ska även dokumentera ordinationen inklusive behovsbedömningen i journalen.

Exempel i grått tas bort innan signering (hela raden i tabellen nedan).

Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gånger per dygn	Adm. sätt	Anvisning med indikation, kontraindikation, max antal tillfällen innan läkarordination samt anmärkning (för införande i Melior max 240 tecken)
<i>Exempel</i> <i>Alvedon tablett</i> <i>500 mg</i>	<i>1-2 st</i>	<i>1-3</i>	<i>po</i>	<i>Indikation: smärta, feber</i> <i>Kontraindikation: grav leversjukdom</i> <i>Får ges vid tre tillfällen innan läkare ska kontaktas</i> <i>Anmärkning: kombinera ej med andra läkemedel innehållande paracetamol</i>

Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gånger per dygn	Adm. sätt	Anvisning med indikation, kontraindikation, max antal tillfällen innan läkarordination samt anmärkning (för införande i Melior max 240 tecken)
Atropin Injektionsvätska 0,5mg/ml	0,01 mg/kg	1	iv	Indikation: Bradykardi, hjärtfrekvens < 50 slag/min Kontraindikationer: Svår hjärtsjukdom t ex kärlkramp, aortastenos
Efedrin Injektionsvätska, 50 mg/ml (1 ml Efedrin 50 mg/ml spädes med 9 ml NaCl 0,9% till 5 mg/ml)	5 mg	3 doser inom 20 minuter	iv	Indikation: Blodtrycksfall till följd av vasodilatation efter utbredd sympatikusblockad Kontraindikation: Svår hjärtsjukdom, aortastenos Försiktighet: Hjärtfrekvens > 80/min
Fenylefrin Injektionsvätska 0,1 mg/ml	0,1 mg	3 doser inom 20 minuter		Indikation: Blodtrycksfall till följd av vasodilatation. Kontraindikation: Hypertyreos Försiktighet: Hjärtfrekvens under 50, pga reflektorisk bradykardi. Svår astma, kan ge bronkkonstriktion
Paracetamol Infusionsvätska 10 mg/ml	1 g	4 doser	iv	Indikationer: Smärtlindring Kontraindikationer: Svår leversjukdom Försiktighet: Leversjukdom, njursjukdom, dehydrering
Alfentanil Alfentanil 0,5 mg/ml Injektionsvätska	0,25–0,5 mg	1 (maxdos 2ml)	iv	Indikationer: Smärta i samband med smärftfulla ingrepp på operation Försiktighet: Äldre sköra patienter ska ges reducerad dos. Patienter med KOL och astma med tanke på andningsdepression.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation Högsbo

**Innehållsansvar:** Jonna Sjöberg Lindeblad, (jonli3), Överläkare

**Godkänd av:** Mikael Forslund Hulgaard, (mikfo3), Överläkare

**Dokument-ID:** SV9761-782711715-1177

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-06-30

**Giltig till:** 2027-06-30