OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Kungälv
Innehållsansvar: Jennie Sjöstrand, (jensj2), Ivasjuksköterska
Godkänd av: Jesper Wallskog, (jeswa1), Överläkare
Giltig från: 2026-09-18
Giltig till: 2028-12-14

Addex-Ammoniumklorid

Bakgrund

Vid behandlingskrävande hypoklorem alkalos kan i första hand NaCl och/eller KCl ges men om detta är otillräckligt eller olämpligt av någon anledning kan NH_4Cl (=Ammoniumklorid) ges.

Varningar

Risk för toxiska biverkningar vid leverskada eller njurinsufficiens.

Administrering

Addex-Ammoniumklorid kan tillsättas till Glukos 50 mg/mL, Glukos med Na 40 + K 20, Glukos 100 mg/mL och Natriumklorid. Max 80 mL får tillsättas till 1000 mL av dessa lösningar.

Infusionshastigheten får vara max 30–40 mmol/timme.

Bör administreras via centralvenös infart.

Dosering

Genomsnittligt dosbehov beräknas enligt följande:
Dos (i mmol) = 0,3 x kroppsvikt (i kg) x base excess (i mmol/L).

Vanligen börjar man med ca hälften av beräknat dosbehov och kontrollerar därefter effekten genom provtagning av base excess och/eller elektrolyter.

Relaterad information

FASS.se Hämtad den 13 mars 2019.

Barium id: 40 524

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Kungälv

Innehållsansvar: Jennie Sjöstrand, (jensj2), Ivasjuksköterska

Godkänd av: Jesper Wallskog, (jeswa1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-149

Version: 5.0

Giltig från: 2026-09-18

Giltig till: 2028-12-14