

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Kungälv

Giltig från: 2024-12-18

Innehållsansvar: Alexandra Halldin, (aleha2), Ivasjuksköterska

Giltig till: 2026-12-04

Godkänd av: Christina Bergqvist Grivans, (chrgr6), Överläkare

# Ocplex, Confidex

## Bakgrund

Ocplex och Confidex är protrombinkomplexkoncentrat som innehåller koagulationsfaktorerna II, VII, IX och X samt Protein C och S.

## Indikation

Vid behov av snabb reversering av Waran-effekt.

Kan även övervägas om behandling med Eliquis, Xarelto eller Lixiana och behov av akut kirurgi eller vid stor blödning.

## Kontraindikation

Överkänslighet mot Heparin eller anamnes på heparininducerad trombocytopeni.

## Administrering

Långsam intravenös injektion, initialt 1 mL/min därefter max 2–3 mL/min – ännu långsammare eller avbryt injektion om debut av takykardi. Kan ges via sprutpump.

### Instruktion för beredning:

1. Värm de öppnade injektionsflaskorna till rumstemperatur, t.ex. i 37-gradigt vattenbad men utan att vatten kommer i kontakt med gummipropparna eller locken på flaskorna.
2. Avlägsna locken på flaskorna och sprita gummimembranen.
3. Följ instruktionen i förpackningen för beredning av lösningen. Viktigt att man försiktigt roterar flaskan med blandningen av pulver och vätska, skaka inte, för att undvika skumbildning. Roter till dess pulvret är fullständigt löst. Lösningen skall vara klar eller lätt opalescent, den får inte vara grumlig.
4. Följ instruktionen i förpackningen om hur lösningen skall överföras till spruta.

**Färdigberedd lösning innehåller 500 IE/20 mL dvs. 25 IE/mL.**

Färdigberedd lösning är ljuskänslig och skall användas omedelbart.

## Dosering

Dosen avgörs av PK före behandling och önskat målvärde.

**Målvärde  $\leq 1,5$  är oftast tillräckligt.** Avrunda till närmaste 500 IE.

Effekten kvarstår ca 6–8 timmar.

Behandling behöver oftast ej upprepas om man samtidigt givit Konakion 10 mg iv, vars effekt inträder inom 4–6 timmar.

Nedanstående tabell anger ungefärliga doser för **målvärde PK  $\leq 1,5$**  vid olika initiala PK-nivåer.

Vikt	PK 1,5–2	PK 2–3	PK >3	Om otillräcklig effekt*) ge ytterligare
40–60	500 IE	1 000 IE	1 500 IE	500 IE
60–90	1 000 IE	1 500 IE	2 000 IE	1 000 IE
>90	1 500 IE	2 000 IE	2 500 IE	1 000 IE

\*) Kontrollera PK ca 10 min efter infusion samt efter ett par timmar. Komplettera med ytterligare Ocplex vb.

**Vid stor blödning och/eller behov av akut kirurgi hos patient som behandlas med Eliquis, Xarelto eller Lixiana** kan Ocplex/Confidex övervägas i tillägg till annan terapi:

- 2 000 IE om <15 timmar sedan senaste tablett
- 1 500 IE om 15–25 timmar sedan senaste tablett

(Pradaxa har antidot: Praxbind)

## Relaterad information

- *Hemostas vid allvarlig blödning* av Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas, <http://www.ssth.se>
- *Kortversion av kliniska råd vid behandling med nya perorala antikoagulantia (NOAK)* av Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas, <http://www.ssth.se>

**Barium id: 33 425**

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Intensivvårdsavdelning Kungälv

**Innehållsansvar:** Alexandra Halldin, (aleha2), Ivasjuksköterska

**Godkänd av:** Christina Bergqvist Grivans, (chrgr6), Överläkare

**Dokument-ID:** SV9761-782711715-224

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2024-12-18

**Giltig till:** 2026-12-04