

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Kungälv

Giltig från: 2025-04-04

Innehållsansvar: Jennie Sjöstrand, (jensj2), Ivasjuksköterska

Giltig till: 2027-04-02

Godkänd av: Christina Bergqvist Grivans, (chrgr6), Överläkare

# Pantoloc®-infusion via sprutpump

## Bakgrund

Pantoloc® hämmar sekretionen av saltsyra i magsäcken, protonpumpshämmare. Vid akut gastrointestinal blödning har infusion Pantoloc® med föregående bolus visats kunna minska risken för reblödning.

## Indikation

Akut gastrointestinal blödning.

## Reaktioner

Tromboflebit vid injektionstället, diarré, huvudvärk.

## Administrering

För att erhålla en färdigblandad **stamlösning** ska 10 ml Natriumklorid 9 mg/ml tillsättas till den frystorkade substansen Pantoloc® 40 mg injektionsflaska. Färdigberedd produkt är en klar gulaktig lösning, **4 mg/ml**.

För **infusionslösning** spädes stamlösningen med ytterligare 10 ml Natriumklorid 9 mg/ml, till **2 mg/ml**.

Infusionslösningen är hållbar i 12 timmar.

## Dosering

Initialt ges 20 ml **injektion Pantoloc® 4 mg/ml = 80 mg**.

Därefter ges **infusionslösning Pantoloc® 2 mg/ml** med en hastighet av 8 mg/timme = 4 ml/timme kontinuerligt under så lång tid som är ordinerat.

**Barium id: 31 444**

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Intensivvårdsavdelning Kungälv

**Innehållsansvar:** Jennie Sjöstrand, (jensj2), Ivasjuksköterska

**Godkänd av:** Christina Bergqvist Grivans, (chrgr6), Överläkare

**Dokument-ID:** SV9761-782711715-226

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-04-04

**Giltig till:** 2027-04-02