

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Kungälv

Giltig från: 2026-03-24

Innehållsansvar: Alexandra Halldin, (aleha2), Ivasjuksköterska

Giltig till: 2028-03-24

Godkänd av: Jesper Wallskog, (jeswa1), Överläkare

Spädningschema läkemedel

Syfte

Enhetlig och säker rutin för beredning och dosering av läkemedel som administreras intravenöst.

För utökad information om blandbarhet se [Kompatibilitet mellan intravenösa läkemedel](#)

	URSPRUNGLIG KONCENTRA- TION	URSPRUNGLIG KONCENTRA- TION I ML	NACL 9 MG/ML SPÄDNING,ML	TOTAL VOLYM, ML	SPÄDD KONCENTRA- TION	ADMINISTRERING
<i>Catapresan - injektion</i>	150 mikrog/mL	1 mL	9 mL	10 mL	15 mikrog/mL	Iv injektion
<i>Catapresan - infusion</i>	150 mikrogr/mL	2 mL	48 mL	50 mL	6 mikrog/mL	Iv infusion enl. rutin
<i>Dexdor - svag</i>	100 mikrogr/mL	Alt. 1: 2 mL Alt. 2: 10 mL	1: 48 mL 2: 240 mL Kan blandas med glukos 5%	1: 50 mL 2: 250 mL	4 mikrog/mL	Iv infusion
<i>Dexdor - stark</i>	100 mikrogr/mL	20 mL	230 mL Kan blandas med glukos 5%	50 mL	8 mikrog/mL	Iv infusion. Om behov av reducerad vätsketillförsel. Finns ej som protokoll i pumparna
<i>Digoxin</i>	0,25 mg/mL	1 mL	Kan spädas med 1,5 mL NaCl	2,5 mL	0,1 mg/mL	Iv injektion. Ges långsamt 0,1 mg/minut
<i>Efedrin</i>	50 mg/mL	1 mL	9 mL	10 mL	5 mg/mL	Iv injektion
<i>Fentanyl</i>	50 mikrogr/mL	2 mL	8 mL	10 mL	10 mikrog/mL	Iv injektion
<i>Insulin Lispro</i>	100 E/mL	0,5 mL	49,5 mL	50 mL	1 E/mL	Iv infusion enligt rutin
<i>Kalium</i>	2 mmol/mL	20 ml	Späds med 20 mL	40 mL	1 mmol/mL	Iv infusion Obs! CVK
<i>Morfin</i>	10 mg/mL	1 mL	9 mL	10 mL	1 mg/mL	Iv injektion

	URSPRUNGLIG KONCENTRA- TION	URSPRUNGLIG KONCENTRA- TION I ML	NACL 9 MG/ML SPÄDNING, ML	TOTAL VOLYM, ML	SPÄDD KONCENTRA- TION	ADMINISTRERING
<i>Svag Noradrenalin</i>	1 mg/mL	2,5 mL	250 mL Kan blandas med glukos 5%	252,5 mL	0,01 mg/mL	Iv infusion enligt rutin
<i>Stark Noradrenalin</i>	1 mg/mL	Alt. 1: 4 mL Alt 2: 11 mL Alt 3: 25 mL	1: 36 mL 2: 100 mL 3: 225 mL Kan blandas med glukos 5%	1: 40 mL 2: 111 mL 3: 250 mL	0,1 mg/mL	Iv infusion enligt rutin. OBS! CVK
<i>Oxycodone</i>	10 mg/mL	1 mL	9 mL	10 mL	1 mg/mL	Iv injektion
<i>Remifentanil (Ultiva)</i>	5 mg torrampull		Torrsubstansen löses med 5 mL och späds sedan vidare med 95 mL. Kan blandas med glukos 5%	100 mL	50 mikrog/mL	Iv infusion enl. rutin

Barium id: 32 682

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Kungälv

Innehållsansvar: Alexandra Halldin, (aleha2), Ivasjuksköterska

Godkänd av: Jesper Wallskog, (jeswa1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-239

Version: 4.0

Giltig från: 2026-03-24

Giltig till: 2028-03-24