

Protrombinkomplexkoncentrat (Ocplex, Confidex)

Förändringar sedan föregående version
Förnyat giltighetsdatum.

Bakgrund

Ocplex och Confidex är protrombinkomplex-koncentrat som innehåller koagulationsfaktorerna II, VII, IX, X samt Protein C och S.

Indikationer

Reversering av blödningsbenägenhet orsakad av Waran (ibland även NOAK), leversjukdom eller K-vitaminbrist.

Kontraindikation

Överkänslighet mot heparin eller anamnes på heparininducerad trombocytopeni

Spädning

Protrombinkomplex 500 IE som torrs substans samt ampull med 20 mL lösningsvätska.

Dosering

Initialt INR/PK-värde	2-2,5	2,5-3	3-3,5	>3,5
Dos Ocplex (mL/kg)	0,9-1,3	1,3-1,6	1,6-1,9	>1,9

Ungefärliga doser för målvärde pK < 1,5

Vikt	PK 1,5–2	PK 2–3	PK >3
40-60kg	500 IE	1000 IE	1500 IE
60-90kg	1000 IE	1500 IE	2000 IE
>90 kg	1500 IE	2000 IE	2500 IE

- Engångsdosen bör ej överstiga 3000IE
- Avrunda till närmsta 500 IE
- Korrigeringen kvarstår i ungefär 6–8 timmar.

Administrering

- Lösningen injiceras sakta intravenöst via sprutpump, initialt 60 mL/h och inte fortare än 180 mL/h
- Om en markant pulsökning inträffar ska injektionshastigheten minskas eller administreringen helt avbrytas
- Till patienter där Ocplex ges för att reversera Waran ges, om man önskar en längre reversering, även vitamin K i form av Konakion 10 mg intravenöst.
- Vid stor blödning och behov av akut kirurgi kan Ocplex övervägas hos patienter som behandlas med Eliquis, Xarelto eller Lixiana:
 - 2000 E om <15 timmar sedan senaste tablett
 - 1500 E om 15–24 timmar sedan senaste tablett

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Alingsås

Innehållsansvar: Monika Bielecka Bengtsson, (monbi),
Överläkare

Godkänd av: Helga Ásgeirsdóttir, (helsg1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-461

Version: 5.0

Giltig från: 2025-04-12

Giltig till: 2027-04-04