

# Midazolaminfusion

## Förändringar sedan föregående version

Förnyat giltighetsdatum.

## Bakgrund

Bensodiazepinderivat. Lugnande medel.

## Indikationer

Ska generellt sett undvikas, p.g.a. ackumulering och ökad risk för delirium, men kan komma i fråga vid t.ex. kramper, alkoholabstinens, vissa drogintoxikationer och hemodynamiskt instabil patient som kräver respiratorvård.

## Biverkningar

Andningsdepression. Amnesi.

## Spädning

10 mL Midazolam 5 mg/mL späds i 40 mL NaCl 9 mg/mL. Detta ger en koncentration på 1 mg/mL.

## Dosering

Bolusdos: 1–2 mg = 1–2 mL

Infusion: Vanligt doseringsintervall är 0.02–0.2 mg/kg/h

## Administrering

Lösningen ges med sprutpump i central eller perifer ven.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Intensivvårdsavdelning Alingsås

**Innehållsansvar:** Monika Bielecka Bengtsson, (monbi),  
Överläkare

**Godkänd av:** Helga Ásgeirsdóttir, (helsg1), Överläkare

**Dokument-ID:** SV9761-782711715-473

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-04-04

**Giltig till:** 2027-04-04