

Seloken (Metoprolol) intravenöst

Bakgrund

Selektiv beta-receptorblockerare.

Indikationer

- Misstänkt eller verifierad myocardiemi
- Supraventrikulära arytmier
- Takykardi, hypertension

Kontraindikationer

- Kardiogen chock
- Sjuk sinusknuta
- AV-block II-III
- Symptomgivande bradykardi eller hjärtfrekvens <45 slag/min
- Symptomgivande hypotension eller systoliskt blodtryck <100 mmHg
- Svår perifer kärlsjukdom med gangränhot

Biverkningar

Perifer kyla i extremiteter, bradykardi, yrsel, huvudvärk, bronkospasm, sömnstörning.

Spädning

Färdigspädd lösning. 1 mg/mL.

Dosering och administrering

Injektion:

- 1–5 mg Seloken intravenöst enligt ordination.
Blodtryckskontroll initialt varannan minut

Vid instabil angina, misstänkt eller säkerställd akut hjärtinfarkt:

- 5 mg + 5 mg + 5 mg Seloken intravenöst. Dosen ges under 1 minut och doserna ges med 2 minuters mellanrum

Infusion:

- Infusionshastighet styrs utifrån patientens hjärtfrekvens, rimlig startdos 1–3 mg/h

OBS på blodtryck- och pulskontroll.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Alingsås

Innehållsansvar: Monika Bielecka Bengtsson, (monbi),
Överläkare

Godkänd av: Per Werner Möller, (permo7), Enhetschef, Helga
Ásgeirsdóttir, (helsg1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-474

Version: 3.0

Giltig från: 2025-05-28

Giltig till: 2027-05-27