

Labetalol (Trandate)

Förändringar sedan föregående version

Förlängt giltighetsdatum.

Bakgrund

Trandate sänker blodtrycket genom att minska det perifera motståndet och genom att minska stresshormonernas effekter på hjärtat. Labetalol blockerar beta₁-, beta₂- samt alfa₁-receptorer.

Indikationer

- Svår hypertension, eklampsi

Kontraindikation

- Obstruktiv lungsjukdom
- Obehandlad hjärtinsufficiens
- Kardiogen chock
- AV-block II-III
- Sjuk sinusknuta

Biverkningar

Hypotension, förhöjda leverprover

Spädning

Färdigspädd lösning. 5 mg/ml.

Dosering och administrering

Bolus:

- 5–10 mg Trandate ges intravenöst
- Vid hypertensiv kris kan upp till 50 mg Trandate ges intravenöst under 3–5 minuter
- Dosen kan upprepas i 5-minutersintervall tills tillfredsställande effekt uppnås
- Totala dosen får ej överstiga 200 mg

Infusion:

- Späd 40 ml Trandate 5 mg/mL med 160 ml Glukos 50 mg/mL, detta ger en koncentration på 1 mg/mL
- Startdos 10-20 mL /h. Titreras upp med 10 ml (10 mg)/h var 10:e minut till önskad effekt.
- Effektiv dos är vanligtvis 50-200 mL (50-200 mg)/h.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Alingsås

Innehållsansvar: Monika Bielecka Bengtsson, (monbi),
Överläkare

Godkänd av: Helga Ásgeirsdóttir, (helsg1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-480

Version: 4.0

Giltig från: 2025-06-27

Giltig till: 2027-04-02