

Efedrin (Efedrin)

Bakgrund

Efedrin verkar blodtryckshöjande genom stimulering av adrenerga alfa- och betareceptorer.

Indikationer

Blodtrycksfall, exempelvis vid generell anestesi, spinalanestesi eller epiduralanestesi

Kontraindikationer

Försiktighet vid ischemisk hjärtsjukdom och takykardi.

Biverkning

Takykardi, extraslag, arytmier, förmaksflimmer, hjärtischemi.

Spädning

Färdigspäddlösning 5 mg/mL i 5 mL ampuller.

Finns även som styrka om 50 mg/mL. Späd 1 mL Efedrin 50 mg/mL i 9 mL NaCl 9 mg/mL. Detta ger en koncentrationen på 5 mg/mL.

Dosering

- 5–10 mg Efedrin ges intravenöst
- Dosen kan upprepas vid behov efter 5–10 minuter

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Alingsås

Innehållsansvar: Monika Bielecka Bengtsson, (monbi),
Överläkare

Godkänd av: Per Werner Möller, (permo7), Enhetschef, Helga
Ásgeirsdóttir, (helsg1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-496

Version: 3.0

Giltig från: 2025-05-28

Giltig till: 2027-05-27