

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Alingsås

Innehållsansvar: Monika Bielecka Bengtsson, (monbi), Överläkare

Godkänd av: Helga Ásgeirsdóttir, (helsg1), Överläkare

Giltig från: 2025-05-28

Giltig till: 2027-05-27

Digoxin

Indikationer

- Frekvensreglering vid förmaksflimmer/fladder

Kontraindikationer

- AV-block II-III
- Sinusarrest
- Uttalad bradykardi

Spädning

1 ml Digoxin 0,25 mg/ml späds i 4 ml NaCl 9 mg/ml. Detta ger en koncentrationen på 0,05 mg/ml.

Dosering

- 0,5 mg ges intravenöst
- Ytterligare 0,25 mg var tredje timma tills önskad effekt
- Sammanlagd dos bör ej överstiga 1,5 mg första dygnet

Administrering

- S-Kalium kontrolleras innan administrering
- Ges långsamt: 0,1 mg/min
- Kan ges i central eller perifer ven

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Alingsås

Innehållsansvar: Monika Bielecka Bengtsson, (monbi),
Överläkare

Godkänd av: Helga Ásgeirsdóttir, (helsg1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-500

Version: 3.0

Giltig från: 2025-05-28

Giltig till: 2027-05-27