

Amiodaron (Cordarone) på IVA

Förändringar sedan föregående version

Förnyat giltighetsdatum.

Bakgrund

Amidarone är ett antiarytmiskt läkemedel för rytm-kontroll av förmaksflimmer. Kan ge upphov till allvarliga biverkningar.

Indikationer

- Allvarliga symtomgivande supraventrikulära och ventrikulära takykardier
- Profylax eller behandling av paroxysmalt förmaksflimmer
- AV-nodal reentrytakykardi med arythmiinducerad svår hjärtsvikt

Kontraindikation

- Sinusbradykardi
- AV-block, bi-trifascikulärt grenblock
- Sjuk sinusknuta.
- Kombinerad läkemedelsterapi kan inducera Torsades de pointes.
- Rubbad sköldkörtelfunktion.

Biverkningar

- Hypotension och bradykardi
- Leversvikt (leverprover kontrolleras regelbundet)
- Risk för tromboflebit om läkemedlet ges via PVK.
- Försämrad hjärtsvikt

Spädning och dosering

Bolusdos:

1. 300 mg Amiodaron späds med 20 ml Glukos 50 mg/ml. Ges intravenöst under 30 minuter, vilket motsvarar 50 ml/h. Används om mindre vätska och snabbare effekt önskas.
2. 300 mg Amidaron späds med 250 ml Glukos 50 mg/ml och ges under 2 timmar. (vanligare ordination på avdelnings- och IMA patienter)

Infusion:

- Därefter 900 mg/dygn. 450 mg Amiodarone späds med 500 ml Glukos 50 mg/ml. Ges intravenöst under 12 timmar, vilket motsvarar 42 ml/h.
- Maxdos: 1200 mg/24 h (ca 15 mg/kg)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Alingsås

Innehållsansvar: Monika Bielecka Bengtsson, (monbi),
Överläkare

Godkänd av: Helga Ásgeirsdóttir, (helsg1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-503

Version: 3.0

Giltig från: 2025-03-31

Giltig till: 2027-03-27