

Adenosin (Adenosin)

Förändringar sedan föregående version

Förnyad giltighetstid.

Bakgrund och syfte

Adenosin är ett läkemedel för att behandla eller diagnostisera arytm. Det har en hämmande effekt på överledningstiden i AV- och sinusknutan.

INDIKATION

- PSVT (Paroxysmalt supraventrikulär takykardi)
- Diagnostiskt för att påvisa accessorisk retledningsbana med preexcitation. WPW.

Kontraindikationer

- AV-block II-III eller "sick sinus syndrome" hos patienter som ej har pacemaker.
- Svår hypotoni
- Instabil angina pectoris

Biverkningar

- Bröstmärta/tryck över bröstet
- Flushkänsla
- Andfåddhet
- Parestesier
- Hypotoni

Spädning

Färdigspädd lösning. 5 mg/mL.

Dosering och administrering

- Ges snabbt intravenöst.
- Initialt ges 5 mg Adenosin följt av flush med ca 5 mL NaCl 9 mg/mL
- Vid behov ges ytterligare 10 mg Adenosin.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Alingsås

Innehållsansvar: Monika Bielecka Bengtsson, (monbi),
Överläkare

Godkänd av: Helga Ásgeirsdóttir, (helsg1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-623

Version: 3.0

Giltig från: 2025-03-31

Giltig till: 2027-03-27