

Ketanestinfusion – IVA Alingsås

Förändringar sedan föregående version

Förnyat giltighetsdatum.

Utförande

Aktiv substans

Esketamin

Indikationer

Anestetikum, ensamt eller i kombination med annat anestetikum.

Smärtlindring.

Kontraindikationer

Patienter hos vilka en höjning av blodtrycket och/eller det intrakraniella trycket utgör en allvarlig risk.

Eklampsi och preeklampsi.

Förpackning

Ketanest 25 mg/ml 2 ml ampull

Spädning

2 ml Ketanest 25 mg/ml spädes med 48 ml Natriumklorid 9 mg/ml =
Ketanest 1 mg/ml

Dosering och administrering

0,03 - 0,06 mg/kg/h, men högre doser kan krävas.

Får ej ges i samma infart/skänkel som Barbiturater.

Doseringsschema för Ketanest finns på sida 2.

Doserings- schema för Ketanest 1mg/ml.	Infusionshastighet i ml/h vid olika kroppsvikter								
	Patientens vikt (kg):	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg	110 kg
Dos (mg/kg/h)									
0,03 mg/kg/h	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	
0,04 mg/kg/h	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.4	
0,05 mg/kg/h	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	
0,06 mg/kg/h	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	6.6	
0,1 mg/kg/h	4	5	6	7	8	9	10	11	
0,2 mg/kg/h	8	10	12	14	16	18	20	22	
0,3 mg/kg/h	12	15	18	21	24	27	30	33	

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Alingsås

Innehållsansvar: Claes Abrahamsson, (claab3),
Ivasjuksköterska

Godkänd av: Helga Ásgeirsdóttir, (helsg1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-71

Version: 6.0

Giltig från: 2025-05-14

Giltig till: 2027-05-14