

Gäller för: Operation Kungälv

Innehållsansvar: Åke Rydenhag, (akery), Överläkare

Godkänd av: Sejal Klingenstierna, (sejpa1), Överläkare

Giltig från: 2024-08-15

Giltig till: 2026-08-15

Generella läkemedelsdirektiv på operation

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar sedan föregående version

Bakgrund och syfte

Legitimerad anestesistsjuksköterska kan efter behovsbedömning ge läkemedel till patient enligt nedan angivna indikationer. Detta gäller vid vård av patient på operation, omhändertagande av patient utanför operationsavdelning och vid transport inom och utanför sjukhuset. Kontraindikationer enligt FASS ska bedömas.

Utförande

Vid bradykardi

- Inj Atropin 0,5 mg/ml, dos 1 ml iv. Maxdos 2 ml.

Vid hypotension

- Inj Efedrin 5 mg/ml (spädd lösning), dos 1 ml iv. Maxdos 6 ml inom 30 minuter.
- Inj Fenylefrin 0,1 mg/ml, dos 0,5–1 ml iv. OBS! Ges bara om HF >60. Maxdos 5 ml.

Vid PONV

- Inj Betapred 4mg/ml, dos 1 ml. Maxdos 1 ml. Vid diabetes eller kortisonbehandling efter kontakt med anesthesiolog.
- Inj Ondancetron 2 mg/ml, dos 2 ml. Maxdos 2 ml. Skall undvikas till kvinnor i fertil ålder om de inte står på säkert preventivmedel som p-piller/p-stav. Kan ges på ordination av anesthesiolog till kvinnor i fertil ålder.

Vid salivsekretion

- Inj Robinul 0,2 mg/ml, dos 1 ml. Maxdos 1 ml.

Vid sedering och smärta

- Inj Fentanyl 50 ug/ml, dos 0,5–1 ml. Maxdos 2 ml
- Inj Midazolam 1 mg/ml, dos 0,5–1 ml iv. Maxdos 2 ml.
- Inj Oxynorm 1 mg/ml, (spädd lösning), dos 1–10 ml iv, maxdos 10 ml.
- Inj Propolipid 10 mg/ml, dos 0,5–2 ml iv. upprepade doser, maxdos 10 ml, vid ingrepp >30 min 20 ml.
- Inj Paracetamol 10mg/ ml, dos 100 ml iv som engångsdos. Upprepa dosen om det gått 6 timmar sedan förra dosen.
- Inj Rapifen 0.1 mg/ml (spädd lösning), dos 1–2 ml iv, maxdos 10 ml, vid längre ingrepp >15 ml.

Vid anesthesiinduktion efter kontakt med anesthesiolog, då anesthesisjuksköterskan sover med kollega.

- Inj Fentanyl 50 ug/ml, dos 1–4 ml. Maxdos 4 ml.
- Inj Propolidid 10 mg/ml, dos 5–20 ml. Maxdos 30 ml.
- Inj Celocurin 50 mg/ml, dos 1–2 ml. Maxdos 2 ml.
- Inj Rokuronium 10 mg/ml, dos 3–5 ml. Maxdos 5 ml.
- TCI med Propolipid 10 mg/ml och Remifentanil 50 ug/ml (spädd lösning) ges enligt TCIprotokoll efter att patientens vikt, längd och ålder är inlagda i pumparna.

Relaterad information

[FASS Vårdpersonal - Start sida](#) hämtad 2022-04-06

[Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården – Konsoliderad - Socialstyrelsen](#) hämtad 2022-04-06

[Ondansetron Accord - FASS Vårdpersonal](#) hämtad 2022-04-06

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Kungälv

Innehållsansvar: Åke Rydenhag, (akery), Överläkare

Godkänd av: Sejal Klingenstierna, (sejpa1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-844

Version: 2.0

Giltig från: 2024-08-15

Giltig till: 2026-08-15