OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Operation Kungälv
Innehållsansvar: Christina Hedman, (chrhe6), Enhetschef
Godkänd av: Sejal Klingenstierna, (sejpa1), Överläkare
Giltig från: 2026-08-21
Giltig till: 2028-08-21

Generella läkemedelsdirektiv på operation

Förändringar sedan föregående version

Tillagt reversering med Glykopyrronium-Neostigmin 0,5 mg/ml+2,5 mg/ml och Propolipid 20 mg/ml. Risker med Ondansetron.

Bakgrund och syfte

Legitimerad anestesisjuksköterska kan efter behovsbedömning ge läkemedel till patient enligt nedan angivna indikationer. Detta gäller vid vård av patient på operation, omhändertagande av patient utanför operationsavdelning och vid transport inom och utanför sjukhuset. Kontraindikationer enligt FASS ska bedömas.

Utförande

Vid bradykardi

- Inj Atropin 0,5 mg/ml, dos 1 ml iv. Maxdos 2 ml.

Vid hypotension

- Inj Efedrin 5 mg/ml (spädd lösning), dos 1 ml iv. Maxdos 6 ml inom 30 minuter.
- Inj Fenylefrin 0,1 mg/ml, dos 0,5–1 ml iv. Undvik vid bradykardi. Maxdos 5 ml.

Vid PONV

- Inj Betapred 4mg/ml, dos 1 ml. Maxdos 1 ml. Vid diabetes eller kortisonbehandling efter kontakt med anestesiolog.
- Inj Ondancetron 2 mg/ml, dos 2 ml. Maxdos 2 ml. Kontraindicerat vid känt förlängt QT-syndrom. Undvik vid förlängd QT-tid. Vid behandling av fertila kvinnor ska man beakta att det finns en liten ökad risk för missbildning vid administrering under graviditetens första trimester.

Vid salivsekretion

- Inj Robinul 0,2 mg/ml, dos 1 ml. Maxdos 1 ml.

Vid sedering och smärta

- Inj Fentanyl 50 ug/ml, dos 0,5–1 ml. Maxdos 2 ml
- Inj Midazolam 1 mg/ml, dos 0,5–1 ml iv. Maxdos 2 ml.
- Inj Oxynorm 1 mg/ml, (spädd lösning), dos 1–10 ml iv, maxdos 10 ml.
- Inj Propolipid 10 mg/ml, dos 0,5–2 ml iv. upprepade doser, maxdos 10 ml, vid ingrepp >30 min 20 ml.
- Inj Paracetamol 10mg/ ml, dos 100 ml iv som engångsdos. Upprepa dosen om det gått 6 timmar sedan förra dosen.
- Inj Rapifen 0.1 mg/ml (spädd lösning), dos 1–2 ml iv, maxdos 10 ml, vid längre ingrepp >15 ml.

Reversering

- Inj Glykopyrronium-Neostigmin 0,5 mg/ml+2,5 mg/ml, dos 1 ml

Vid anestesiinduktion efter kontakt med anestesiolog, då anestesisjuksköterskan söver med kollega.

- Inj Fentanyl 50 ug/ml, dos 1–4 ml. Maxdos 4 ml.
- Inj Propolidid 10 mg/ml, dos 5–20 ml. Maxdos 30 ml.
- Inj Celocurin 50 mg/ml, dos 1–2 ml. Maxdos 2 ml.
- Inj Rokuronium 10 mg/ml, dos 3–5 ml. Maxdos 5 ml.
- TCI med Propolipid 10 mg/ml alt. Propolipid 20 mg/ml och Remifentanil 50 ug/ml (spädd lösning) ges enligt TCI protokoll efter att patientens parametrar är inlagda i pumparna.

Relaterad information

FASS Vårdpersonal - Startsida

Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården – Konsoliderad - Socialstyrelsen

Ondansetron Accord - FASS Vårdpersonal

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Kungälv

Innehållsansvar: Christina Hedman, (chrhe6), Enhetschef

Godkänd av: Sejal Klingenstierna, (sejpa1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-844

Version: 3.0

Giltig från: 2026-08-21

Giltig till: 2028-08-21