

Gäller för: Operation Kungälv

Innehållsansvar: Erik Hultberg, (erihu11), Specialistläkare

Godkänd av: Sejal Klingenstierna, (sejpa1), Överläkare

Giltig från: 2024-12-09

Giltig till: 2026-12-09

Parecoxib (Dynastat©)

Förändringar sedan föregående version

Tillägg i kontraindikationer och administrering.

Indikationer

- Korttidsbehandling av postoperativ smärta

Spädning

- 40 mg Parecoxib löses i 2 ml NaCl 9 mg/ml. Detta ger en koncentration på 20 mg/ml.

Dosering

- Normaldos är 40 mg och upprepningsdoser 20 mg var 6–12 h upp till max 80 mg per dygn
- Halvera dos om patient är över 65 år, väger under 50 kg eller har nedsatt njurfunktion
- Ej dokumenterat för personer under 18 år

Administrering

- Injiceras snabbt intravenöst. Observera risk för utfällning i kombination med andra läkemedel och undvik detta genom att följa rutin enligt FASS.

Kontraindikationer

- Överkänslighet/Allergi
- Blödande ulcus
- Kronisk hjärtsvikt
- Inflammatorisk tarmsjukdom
- Leversvikt
- Ischemisk hjärtsjukdom
- Graviditet under 3:e trimestern och vid amning

Förpackning

- Parecoxib 40 mg som torrs substans i ampull samt ampull med 2 ml NaCl 9 mg/ml.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Kungälv

Innehållsansvar: Erik Hultberg, (erihu11), Specialistläkare

Godkänd av: Sejal Klingenstierna, (sejpa1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-848

Version: 2.0

Giltig från: 2024-12-09

Giltig till: 2026-12-09