

Gäller för: Operation Kungälv

Giltig från: 2024-10-16

Innehållsansvar: John Grenelle, (johfo9), Specialistläkare

Giltig till: 2026-10-16

Godkänd av: Sejal Klingenstierna, (sejpa1), Överläkare

# Tandvård med anestesi

## Förändringar sedan föregående version

Tagit bort att vi värmer tuberna i flaska med varm vätska i, de ligger numera i värmeskåp. Lägger till att vi har vakumkudde för optimalt upplägg. Preciserar både lustgas & sevoflurane som maskinduktionsläkemedel. Information om att Op personalen tar hand om första patienten för dagen.

## Bakgrund och syfte

Vanligt förekommande ingrepp på sjukhustandvården är tandextraktioner samt lagningar. Patientgrupper som förekommer är vuxna med funktionshinder och/eller tandvårdsrädsla. Denna rutin ska underlätta omhändertagandet av dessa patienter.

## Utförande

### Preoperativt

Kan/vill patienten svälja tabletter skall de ha premedicinering enligt ordination. Om inte, kan de få inj Midazolam p.o, blanda med Coca-cola, finns i kylskåpet i läkemedelsrummet på operation.

Första patienten för dagen tar alltid operationspersonal hand om. Detta innebär att vi på operation ansvarar för premedicineringen.

Infart om det är möjligt innan sövning sätter vi på salen.

- Premedicinering
  - T Paracetamol 1g alt inf Paracetamol 1g iv
  - Arcoxia 120 mg alt inj Toradol 15-30 mg iv perop
  - K Omeprazol 20 mg
  - T Postafen 25 mg
- Premedicinering Midazolam

Midazolam 5 mg/ml, blandas med fördel i kall coca-cola (finns i läkemedelsrummet)

| Ålder   | Dos mg |
|---------|--------|
| < 50 år | 15     |

|            |     |
|------------|-----|
| 50 – 60 år | 10  |
| 60 – 70 år | 7.5 |
| > 70 år    | 5   |

Låt det vara lugnt kring dessa patienter. Vill de inte byta om, så ta ingen strid.

## På opsalen

- Videolaryngskop
- TCI, nasalintubation, välj lämpligen en tubstorlek mindre än vid oral intubation. Använd en tub som är uppvärmd i värmeskåpet.
- Applicera Xylocaingel i den näsborre där tuben ska föras in.
- Svalgpacka –
  - 1. Gasväv med rtg-tråd som finns sterilpackad, den är ”stor” så passar inte små munnar.
  - 2. Gasväv 5 cm bred som vi klipper av. I bägge fallen ska en bit av svalgpacken placeras utanför munnen.
- I Orbit under Luftvägskontroll skrivs att svalgpack finns och vid opslut att den är dragen.
- Fixera huvudet i lätt extension med hjälp av vakuumkudde. (när möjligt & lämpligt)

Om de inte går att sätta pvk, kan patienten induceras på Sevoflurane/lustgas, för att sedan övergå till TCI.

## Peroperativt

- Tandläkaren lokalbedövar innan ingreppet vilket leder till att man oftast kan ha låg dosering utav läkemedlen – TCI.
- De som inte fått premedicinering i tablettform bör få: inf Paracetamol 1 g iv, även inj Toradol 15 mg – 30 mg kan övervägas (ordination av anestesiläkare).
- Vid väckning undvik opioider i.v, om behov skulle uppstå ge då inj Fentanyl 25 ug iv (kan upprepas v.b) och inj Ondansetron 4 mg i.v och inj Betapred 4 mg i.v
- Ibland kan vi för vårdcentralens räkning få ta blodprover på patienterna. Även att en annan undersökning görs kan förekomma.

## Ansvar

Anestesisjuksköterskor och anestesiläkare har ansvar att följa denna rutin. MLA-operation och verksamhetsutvecklare ser till att rutinen blir känd.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation Kungälv

**Innehållsansvar:** John Grenelle, (johfo9), Specialistläkare

**Godkänd av:** Sejal Klingenstierna, (sejpa1), Överläkare

**Dokument-ID:** SV9761-782711715-850

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2024-10-16

**Giltig till:** 2026-10-16