

Gäller för: Operation Kungälv

Innehållsansvar: Sejal Klingenstierna, (sejpa1), Överläkare

Godkänd av: Sejal Klingenstierna, (sejpa1), Överläkare

Giltig från: 2025-09-03

Giltig till: 2027-09-03

Amning och anestesi

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar sedan föregående version. (Barium id: 31 599, version 3)

Bakgrund och syfte

Att tydliggöra vilka läkemedel som gäller vid anestesi för ammande mammor.

Att tydliggöra amningsråd till ammande mammor efter operation i narkos.

Utförande

Förutsättning

- Individuell bedömning
- Barnet är friskt
- Bruk av adekvata doser
- Amning är möjlig när mamman är vaken, alert och barnet är hungrigt

Rekommendation

De läkemedel som är direkt olämpliga för ammande mödrar är Diazepam och Petidin

1. Amma 30–60 minuter innan anestesi
2. Preoperativ medicinering: paracetamol och ibuprofen eller diklofenak
3. Regional anestesi i första hand
4. Generell anestesi
 - Induktion med propofol eller tiopental
 - Underhåll med sevofluran och lustgas, alternativt TCI med remifentanil och propofol
 - Analgetika: remifentanil eller fentanyl

- Muskelrelaxantia: suxameton och/eller rokuronium
- Antiemetika: Ondansetron

5. Postoperativ smärtlindring

- Paracetamol
- Ibuprofen eller diklofenak
- Morfin i kortidsbehandling, (undvik oxikodon)

Mer information om läkemedel och amning kan fås på [Janusmed amning - Janusinfo.se](#) Länk hämtad 2019-01-24

Länk

[Amning och anestesi, AnOpIva SU/Östra](#)

Ansvar

Verksamhetschef/vårdenhetschef/enhetschef ansvarar för implementera riktlinjen och att se till att den efterlevs inom sin verksamhet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Kungälv

Innehållsansvar: Sejal Klingenstierna, (sejpa1), Överläkare

Godkänd av: Sejal Klingenstierna, (sejpa1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-856

Version: 2.0

Giltig från: 2025-09-03

Giltig till: 2027-09-03