

Gäller för: Operation Angered

Giltig från: 2024-09-25

Innehållsansvar: Snorri Laxdal Karlsson, (snoka1), Överläkare

Giltig till: 2029-09-25

Godkänd av: Per Werner Möller, (permo7), Enhetschef

Transanal Haemorrhoidal De-arterialization (THD) i spinal anestesi

Bakgrund

THD vid hemorrojder innebär liggering av artärer och lyftning av slemhinna med syfte att minska arteriellt överflöde och återskapa analkanalens normala anatomi och fysiologi. Metoden innebär identifiering av artärer med dopplersignal som kräver bra blodtryck. Sittspinal med kortverkande lokalanestetika är en säker metod för att uppnå bra operationsförhållanden med bibehållen hemodynamik.

Preoperativt

- Vid mottagningsbesök informerar kirurg patienterna om ingreppet samt att det vanligtvis görs i ryggbedövning
- Vid preoperativ bedömning i Orbit beaktar narkosläkare kontraindikationer för ryggbedövning
- Standard premedicinering

Monitorering

- Standard

Anestesi

- Spinal, 'saddle-block'
 - Prilocain 20 mg/ml, hyperbar, kortverkande lokalanestetikum
 - Dosering: 0,5–1 ml (10–20 mg)
 - Patienten sitter 10 minuter efter injektion för att koncentrera effekten till operationsområdet.
 - Sedation vid behov, TCI propofol/remifentanyl
 - Perianal block läggs av kirurgen
- Vid kontraindikation för spinal görs ingreppet i generell anestesi
 - LM, TCI propofol/remifentanyl

- Inf. fenylefrin, SBT \geq 110 mmHg
- Perianal block läggs av kirurgen

Postoperativt

- Bladderscan enligt Rutin – [bladderscan och blåstömning](#)
 - Bladderscan på operation om knivtid mer än 1 timma
 - Tappning om över 400 ml i blåsan
 - Efter spinalanestesi görs bladderscan varje timma tills dess att patienten kan kissa själv
- Patienterna måste ha återfått full styrka och kunna kissa innan utskrivning

Information

[Spinal anaesthesia for ambulatory surgery \(bjaed.org\)](#)

SFAISs riktlinjer - [21-](#)

[5b Kortfattad översikt över antikoagulantia och ryggbedövning 110328.pdf \(sfai.se\)](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Angered

Innehållsansvar: Snorri Laxdal Karlsson, (snoka1), Överläkare

Godkänd av: Per Werner Möller, (permo7), Enhetschef

Dokument-ID: SV9761-782711715-872

Version: 2.0

Giltig från: 2024-09-25

Giltig till: 2029-09-25